

Acatar Allergy 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór, 10 ml



Cena: 30,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu

Acatar Allergy to lek w postaci bezbarwnego roztworu do nosa przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. W składzie zawiera azelastynę, która należy do grupy leków działających przez zapobieganie działaniu histaminy (leki przeciwhistaminowe) i innych substancji, które organizm wytwarza podczas reakcji alergicznej, zazwyczaj powodujących u pacjenta wodnistą wydzielinę z nosa, kichanie, swędzenie lub zatkany nos. Lek Acatar Allergy stosuje się w objawowym leczeniu alergicznego, a także sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa i zaostrzeń (napadów) niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Wskazania

Lek Acatar Allergy stosuje się w leczeniu objawowym:

- sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i zaostrzeń (napadów),
- niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Skład

1 ml Acatar Allerg zawiera:

- substancję czynną: azelastyny chlorowodorek 1 mg,
- pozostałe składniki: hypromeloza 2910, disodu edetynian, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek i woda oczyszczona.

Działanie

Przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

- Dorośli oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej: jedno rozpylenie (0,14 ml) do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (0,56 mg azelastyny chlorowodoru).
- Wydmuchaj nos.
- Przed pierwszym użyciem usuń plastikowe zabezpieczenie nasadki.
- Zdejmij nasadkę ochronną.
- Przed pierwszym użyciem naciśnij kilkakrotnie pompkę do momentu równomiernego rozpylenia aerozolu (3-4 razy).
- Wykonaj jedno rozpylenie do każdego otworu nosowego, trzymając głowę pionowo, nie przechylając głowy do tyłu.
- Wytrzymaj końcówkę pompki i nałóż nasadkę ochronną.
- Jeżeli azelastyna nie była stosowana przez 6 lub więcej dni, pompka musi zostać ponownie przygotowana do użycia poprzez jej kilkakrotne naciśnięcie i puszczenie do momentu pojawienia się delikatnej mgiełki.

Czas stosowania

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli objawy nasiliły się, lub utrzymują się dłużej niż 3 dni bez znaczącej poprawy pomimo stosowania leku Acatar Allergy aerozol do nosa.
- Lek Acatar Allergy nie powinien być stosowany bez nadzoru lekarza dłużej niż 4 tygodnie.

Przeciwwskazania

Leku Acatar Allergy nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przechowywanie

- Acatar Allergy należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
- Nie stosować dłużej niż 6 miesięcy po pierwszym użyciu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- po podaniu może pojawić się w ustach nieprzyjemny smak (często wskutek nieprawidłowej metody podania, mianowicie zbytniego odchylenia głowy do tyłu podczas podawania), co w rzadkich przypadkach może prowadzić do nudności.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- uczucie dyskomfortu w nosie związane z objętą stanem zapalnym błoną śluzową nosa (pieczenie, świąd),
- kichanie,
- krwawienie z nosa.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
nudności.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- uczucie zmęczenia (znużenia, wyczerpania),
- zawroty głowy lub osłabienie (mogą być również spowodowane przez samą chorobę),
- reakcje nadwrażliwości, wysypka, świąd, pokrzywka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acatar Allergy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

- Produkt może być stosowany przez dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starsze.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Bardzo rzadko mogą wystąpić zmęczenie, znużenie, zawroty głowy lub osłabienie, które mogą być wywołane samą chorobą lub stosowaniem azelastyny w postaci aerozolu do nosa.
- W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Pominięcie zastosowania leku Acatar Allergy

- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
- W przypadku zapomnienia przyjęcia leku należy przyjąć go po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, przyjmując kolejną dawkę 12 godzin później, o ile konieczne.

