

## Aescin 20 mg, 90 tabletek powlekanych



Cena: 48,54 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,02 g
Producent	KUTNOWSKIE Z.F. "POLFA" S.A.

### Opis produktu

### Wskazania

Przewlekła niewydolność żylna, żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu, leczenie zapalenia żył kończyn dolnych, profilaktyka i leczenie krwiałków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

### Skład

Substancją czynną leku jest alfa-escyna, inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian; otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E110), silikonowa emulsja przeciwiپیenna.

## Działanie

Preparat o miejscowym działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żyłne.

## Dawkowanie

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym. Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę. W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny. Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna zmiana dawkowania. Dzieci: nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

## Przeciwwskazania

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu