

AkusTone Alert, krople do uszu, 15 ml



Cena: 22,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka

-

Producent

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

AkusTone Alert to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w stanach zapalnych ucha zewnętrznego, które objawiają się bólem, świądem i zaczerwienieniem. Preparat tworzy w zewnętrznej części przewodu słuchowego warunki, które przeciwdziałają rozwojowi drobnoustrojów, takich jak bakterie i grzyby. Krople zawierają olejki eteryczne, które wykazują działanie zapobiegające rozwojowi drobnoustrojów, a zawarty glicerol działa nawilżająco, łagodząco na powstałe podrażnienia oraz zmiękcza na czop woskowinowy, dzięki czemu ułatwione zostaje jego usunięcie.

Zastosowanie

Zalecany jest w stanach zapalnych ucha zewnętrznego, objawiających się: bólem, świądem, zaczerwienieniem, do stosowania oraz zapobiegawczego u osób z tendencją do występowania ucha płwaka.

Sposób użycia

W stanach zapalnych ucha zewnętrznego, o ile lekarz nie zaleci inaczej:

- 1-2 kropli 3-4 razy dziennie.

W celu zapobiegania infekcjom zewnętrznego przewodu słuchowego (ucho pływaka):

- 1-2 kropli po kąpieli w basenie.

Składniki

Woda oczyszczona, glicerol, polisorbát 80, olejek z drzewa herbacianego, chlorek cetylopirydyniowy, kwas octowy, olejek geraniowy, octan sodu.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej, otwartych ran lub gdy w uchu znajduje się ciało obce, a także równocześnie z innymi miejscowo działającymi produktami do uszu.
- Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.
- Nie należy podawać wyrobu do ucha z założonym aparatem słuchowym.

Ważne wskazówki

- Wyrób należy aplikować co najmniej na godzinę przed włożeniem aparatu słuchowego.
- Wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania doraźnego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia

- Każdy silny ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.
- Jeżeli po upływie 2 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 2 dni od rozpoczęcia stosowania pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.

