


Aleric Deslo Active 0,5mg/ml, roztwór doustny, 60ml



Cena: 22,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat oraz starszych, łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

Działanie

Lek przeciwalergiczny, ułatwiający kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Dawkowanie

- dzieci w wieku 6 do 11 lat: 5ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę. W przypadku niedowagi lub nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki.
- dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10ml (2 łyżki miarowe o pojemności 5ml) roztworu doustnego raz na dobę. Jeśli do butelki dołączona jest strzykawka doustna, można ją zamiennie używać do odmierzania odpowiedniej ilości roztworu doustnego. Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Dawkę roztworu należy połknąć i następnie popić wodą. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Skład

substancja czynna: desloratadyna 0,5mg na 1ml leku, substancje pomocnicze: cytrynian sodu, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910, aromat tutti frutti płynny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na desloratadyne lub którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosować leku w czasie ciąży lub karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.