

Boiron, Aconitum napellus 5 CH, granulki 4g

Cena: 15,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Lek ma szerokie działanie terapeutyczne i stosowany jest w leczeniu różnych chorób. Opis leku uwzględnia wybrane wskazania, w których lek jest stosowany w leczeniu homeopatycznym. Ma on charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty lekarskiej ani konsultacji farmaceutycznej.

Wybrane wskazania leku

- Ból gardła - przeziębienie z wysoką gorączką. Objawy występują nagle, zwykle nocą. Chory odczuwa gorąco, suchość, ból gardła i jest osłabiony.
- Gorączka - pojawia się nagle i jest wysoka. Skóra jest sucha, twarz zaczerwieniona, chory odczuwa pragnienie i pogorszenie w nocy (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Kaszel - charakteryzuje się nagłym początkiem. Kaszel jest suchy i pojawia się po oziębieniu ciała, zazwyczaj towarzyszy mu wysoka gorączka (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Kolka brzuszna - występują gwałtowne bóle brzucha z niepokojem i pobudzeniem.
- Przeziębienie - okres początkowy często z gorączką. Przebieg jest nagły, gwałtowny, występują dreszcze i kichanie. Skóra jest ciepła i sucha, chory odczuwa duże pragnienie. W nocy następuje pogorszenie.
- Różyczka - początek jest nagły i gwałtowny, gorączka jest wysoka lub niewielka. Wysypka średnioplamista o kolorze różowym, najpierw pojawia się na twarzy a potem na całym ciele. Skóra jest sucha, chory odczuwa pragnienie i ma powiększone węzły chłonne potyliczne (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Zapalenie spojówek - zapalenie występuje nagle. Towarzyszy mu światłowstręt, gorączka, uczucie piasku pod powiekami, zaczerwienione i podrażnione oko.
- Zapalenie układu moczowego - występują stany zapalne w przebiegu przeziębienia. Następuje zatrzymanie lub zaburzenie w oddawaniu moczu.

Skład

Aconitum napellus 5 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działanie niepożądane

Nieznane.

Interakcje

Brak. Lek może być stosowany z innymi lekami homeopatycznymi lub alopacyjnymi.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

W związku z obecnością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją glukozy, niedoborem laktazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy.

W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być zażywany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharozy bądź izomaltazy czy uspośledzonym wchłanianiem glukozy.