Apteka Urtica
ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

Boiron, Apis mellifica 15 CH, granulki 4 g

Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Wskazanie I

Nieżyt nosa o podłożu alergicznym # . Obrzęk błony śluzowej nosa o etiologii zapalnej lub alergicznej. Poprawa pod wpływem zimna.

Dawkowanie

- Stan ostry: 5 granulek co 10 - 15 minut, w miarę poprawy rzadziej.
- Leczenie podostre/przewlekłe: 2 - 4 razy na dobę. W przypadku małych dzieci lek rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

Wskazanie II

Oparzenia skóry (I stopnia). Skóra zaróżowiona, kłujący ból, obrzęk, poprawa pod wpływem zimnych okładów.

Dawkowanie

5 granulek co 10 - 15 minut, w miarę poprawy rzadziej. W przypadku małych dzieci lek rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

Wskazanie III

Opryszczka wargowa. Piekący, kłujący obrzęk, zmniejszający sie pod wpływem zimna.

Dawkowanie

5 granulek 4 - 5 razy dziennie. W przypadku małych dzieci lek rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

Wskazanie IV

Osutka świetlna. Miejscowy rumień skóry, oparzenie skóry I stopnia, pokrzywka. Nagle pojawiający się czerwonoróżowy miejscowy

obrzęk skóry. Pogorszenie pod wpływem ciepła. Poprawa pod wpływem zimnych okładów.

Dawkowanie

5 granulek co 10 - 15 minut, w miarę poprawy rzadziej. W przypadku małych dzieci lek rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

Wskazanie V

Ukąszenia owadów. Jasnoróżowy, kłujący, piekący obrzęk ustępujący pod wpływem zimnych okładów.

Dawkowanie

5 granulek co 10 - 15 minut, w miarę poprawy rzadziej. Można stosować w połączeniu z Ledum palustre 5CH 4 - 6 razy dziennie.

Wskazanie VI

Wysiękowe zapalenie stawów

Dawkowanie

5 granulek 4 - 5 razy dziennie. W przypadku małych dzieci lek rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

Skład

Apis mellifica 15 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (około 80 granulek).