

Boiron, Cantharis 5 CH, granulki 4g



Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Wybrane wskazania leku

- Angina - pacjent czuje poprawę podczas picia gorącego płynu. Występuje zapalenie gardła z obrzękiem i intensywnym pieczeniem, z owrzodzeniami pokrytymi pseudobłoniastym wysiękiem, z aftami i przylegającym śluzem.
- Bóle jajników - bóle przydatków o charakterze palącym z towarzyszącym stanem zapalnym układu moczowego.
- Oparzenie - oparzenie drugiego stopnia. Pojawiają się duże pęcherze, które są wypełnione jasnym płynem, są zaczerwienione, występuje obrzęk i silny ból.
- Opryszczka - pęcherzyki są duże i piekące (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Rumień słoneczny - duże pęcherze z piekącymi bólami, swędzące, dolegliwości nasilają się na zimnym powietrzu oraz w ciepłym pokoju.
- Ukąszenia przez zwierzęta i jadowite owady - obrzęk o odcieniu różowym z kłującymi i piekącymi bólami, które zmniejszają się pod wpływem miejscowego zimna.
- Zaburzenie żołądkowo - jelitowe - piekące, przeszywające bóle brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka z piekącą zgagą, występuje biegunka z piekącymi, jasnymi stolcami, z domieszką śluzu podbarwionego krwią.
- Zapalenie układu moczowego - występują piekące, gwałtowne bóle przed, w czasie i po mikcji.

Skład

Cantharis 5 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działanie niepożądane

Nieznane.

Interakcje

Brak. Lek może być stosowany z innymi lekami homeopatycznymi lub alopacyjnymi.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

W związku z obecnością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją glukozy, niedoborem laktazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy. W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być zażywany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharozy bądź izomaltazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy.