

Boiron, Colocynthis 5 CH, granulki 4g

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.



Opis produktu

Jest to homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Wybrane wskazania leku

- Biegunka - bolesne biegunki z silnym parciem na stolec (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
- Ból brzucha - bóle są tak silne, że zmuszają chorego do przyjęcia pozycji skulone
- Ból żołądka - bóle są bardzo silne i najczęściej pojawiają się pod wpływem złości. Bóle promieniują do jelit, chory odczuwa gorzyc w ustach.
- Bóle jajników - występują gwałtowne, napadowe bóle, szczególnie przy dolegliwościach lewostronnych, nerwobóle o charakterze kolkki, poprawę przynosi ucisk bolącego miejsca i ciepło.
- Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - występuje ból brzucha, który ma charakter kurczowy, chory zgina się w pól.
- Kolka żółciowa - towarzyszy kamicy żółciowej, występuje ból o charakterze kurczowym. Ból zmusza chorego do zgięcia w pól (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
- Dolegliwości reumatyczne - rwa kulszowa, w której bóle są kłujące, rozdzierające lub ciągnące ze współistniejącym uczuciem odrętwienia (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 30 CH).
- Kurcze - ustępują pod wpływem ciepła i po zgięciu kończyny.
- Operacje chirurgiczne - lek stosowany jest w celu zapobiegania skurczowym bólom pooperacyjnym, zwłaszcza po zabiegach jamy brzusznej.
- Zaburzenia miesiączkowania - spastyczne bóle są gwałtowne i napadowe, bardziej nasilone po lewej stronie. Bóle zmniejszają się w pozycji zgiętej w pól, pod wpływem ciepła i silnego ucisku (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).

Skład

Colocynthis 5 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.