

Boiron, Corallium rubrum 5CH, granulki 4g



Cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Skład

Corallium rubrum 5CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 2 - 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Wskazania

- Kaszel - ma charakter wybuchowy, spastyczny z objawami duszenia się i sinicą. Kaszel przychodzi w atakach, których pacjent nie jest w stanie powstrzymać. Kaszel wywołany jest zimmem lub nasila się pod wpływem zimna i jest spowodowany sptywaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła w przebiegu zapalenia zatok przynosowych lub sitowych albo spowodowany jest okresowymi nieżytami błony śluzowej nosa (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
- Krztusiec - występuje atak duszenia się dziecka przed napadem kaszlu, który wskazuje na poważne neurotyczne przyczyny. Dziecko dosłownie łapie powietrze i purpurowieje na twarzy, zanim zacznie się napad szczekającego kaszlu. Krótkie ataki następują jeden po drugim. Kaszel brzmi jak krótkie serie z pistoletu maszynowego (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Odkrztuszanie - plwociny są białe i gęste.
- Zapalenie zatok - występuje zapalenie zatok szczękowych lub czołowych z obecnością ciągnącej się wydzieliny, sptywającej po tylnej ścianie gardła.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.