

Boiron, Ferrum phosphoricum 9 CH, granulki 4g



Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Wskazania

- Gorączka - niezbyt wysoka gorączka, twarz naprzemiennie zaczerwieniona, a następnie blada. Występują przekrwienne bóle głowy, suchy kaszel, niewielkie pragnienie, zapalenie nosogardzieli (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Grypa - lek stosowany na początku grypy kiedy objawy nie są nasilone. Chory czuje się dobrze ale towarzyszą mu krwawienia z nosa, ból uszu, dreszcze, kaszel, uczucie zimna, niewielka gorączka
- Nietrzymanie oczu - występuje zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Wskazanie to dotyczy wyłącznie dzieci osłabionych.
- Ospa wietrzna - okres inwazyjny. Początek łagodny, stan podgorączkowy, mogą towarzyszyć bóle uszu czy krwawienia z nosa.
- Świnka - lek stosowany w okresie początkowym. Wówczas występuje lekki stan podgorączkowy, który stopniowo rośnie, suchy kaszel, czasem krwawienia z nosa czy bóle uszu.
- Zapalenie ucha - lek stosowany w zapaleniu ucha środkowego z niezbyt wysoką gorączką, osłabieniem, z kłującymi bólami i z towarzyszącym krwawieniem z nosa (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

Skład

Ferrum phosphoricum 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Stosować doustnie, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Wskazania

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z lekarzem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.