

Boiron, Ipeca 5 CH, granulki 4g



Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-----------|-------------|
| Dawka | - |
| Producent | BOIRON S.A. |

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Wybrane wskazania leku

- Astma - twarz jest blada i zasiniona, kaszel duszący i świszczący, nasilający się pod wpływem ciepła i ruchu. Często towarzyszą mu nudności i wymioty (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Biegunka - stolce mają odcień białawy lub zielonkawy. Chory ma nudności, wymioty, jest osłabiony. Biegunka występuje po spożyciu niedojrzałych owoców (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Ciąża - lek stosowany jest w okresie ciąży, kiedy kobieta cierpi na nieustające mdłości, które nie zmniejszają się nawet po wymiotach. Występuje ślinotok, wstręt do jedzenia, uczucie pustki w żołądku (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Kaszel - wrażenie łaskotania w gardle, kaszel jest suchy, napadowy ze współistniejącymi wymiotami i nudnościami (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Krztusiec - z napadami kaszlu powodującego wymioty i sinicę (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
- Niestrawność - towarzyszą jej nudności ze ślinotokiem.
- Wymioty - utrzymujące się nudności, biegunki o odcieniu zielonkawym (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Zapalenie rogówki - rogówka ma odcień ziemisty, jest silnie zaczerwieniona. Występuje nadmierne łzawienie, światłowstręt, skłonność do ropienia i robienia się owrzodzeń.

Skład

Ipeca 5 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Stosować doustnie, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.