

Boiron, Lycopodium clavatum 5CH, granulki 4g



Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Skład

Lycopodium clavatum 5CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (około 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Wskazania

- Angina - lek stosowany w przypadku nawracających angin zaczynających się po prawej stronie lub przechodzących ze strony prawej na lewą.
- Łysienie - w przypadku obserwowanego wczesnego siwienia i wypadania włosów.
- Niestrawność - brzuch jest rozdęty, chory szybko odczuwa sytość po posiłku. Stan chorego pogarsza cebula, czosnek, kapusta, fasola (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Owrzodzenia podudzi - owrzodzenie pojawia się częściej na prawej nodze. Jest ono niebolesne albo swędzące i piekące.
- Wymioty - lek stosowany w wymiotach acetonemicznych u dzieci. Leku nie należy podawać dziecku jeżeli ma ono skłonność do zapadania na zapalenie uszu (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Wzdęcia - uczucie pełności w żołądku, które utrzymuje się po spożyciu posiłku, z wzdęciem dolnej połowy brzucha. Poprawa następuje po oddaniu gazów (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Zaparcia - są spowodowane stanem spastycznym jelit z częstą nieskuteczną potrzebą oddawania stolca. Stolce są długie i wąskie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z lekarzem. Ostrzeżenia i środki ostrożności Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.