

## Boiron, Nitricum acidum 5CH, granulki 4g



Cena: 14,90 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Postać	granulki
Producent	BOIRON S.A.

### Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania

### Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 2 - 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

### Wskazania leku

- Brodawki - zlokalizowane na grzbietowej powierzchni dłoni i podeszwach stóp. Mają kolor żółty i mogą być pokryte zrogowaciałym naskórkiem. Brodawki są uszypułowane, szerokie, karbowane, kłujące, swędzące, wilgotne i sączące; łatwo krwawią, powodując ostry, kłujący ból (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Kłykciny - brodawczaki, kłykciny kończyste, kłykciny szyjki macicy. Są one uszypułowane, miękkie, swędzące, sączące, łatwo krwawiące; występuje ból o charakterze drzazgi (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Odmrożenie - występują krwawiące owrzodzenia i bóle, które nasilają się pod wpływem zimna i dotyku.
- Owrzodzenia podudzi - bolesne owrzodzenie (odczucie wbijania drzazg), zabarwione na czerwono. Owrzodzenie ma nieregularne brzegi i łatwo krwawiące dno (pod wpływem najmniejszego dotyku). Niekiedy może występować podrażająca wydzielina podbarwiona krwią (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Wywinięcie powieki - chory odczuwa kłujące, ostre i piekące bóle oczu, które dodatkowo łzawią.

### Skład

Nitricum acidum 5CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

### Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z lekarzem.

### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.