

Boiron, Selenium metallicum 9 CH, granulki 4g



Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Wybrane wskazania leku

- Zaburzenia pamięci - występują u studentów, spowodowane są nadmiarem pracy i niedostatkami snu. Zaburzenia o typie "zapominalskim w ciągu dnia, ale w nocy śni się o tym, czego zapomniasto się zrobić w ciągu dnia". Zaburzenia pamięci współistnieją z silnym osłabieniem - niepowstrzymana potrzeba położenia się i spania (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
- Zapalenie krtani - występuje u śpiewaków i mówców. Lek należy przyjmować po 5 granulek co drugi dzień na przemian z Phosphorus 9 CH.
- Łojotok - występuje tłusty łojotok z poceniem skóry owłosionej i wypadaniem włosów u osoby przemęczonej o twarzy błyszczącej i tłustej. Skóra jest usiana zaskórnikami i mikrotorbielami łojotokowymi (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Łysienie - wypadanie włosów łatwo przetłuszczających się, skóra jest tłusta, świecąca, z trądzikiem i wągrami, osoba jest wyczerpana fizycznie i psychicznie (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Łuszczyca - głównie łuszczyca dłoni (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Trądzik - cera jest tłusta z wągrami, występuje łojotok. Osoba jest osłabiona, wypadają jej włosy (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Zaburzenia funkcji seksualnych - występuje uczucie wyczerpania w związku z nadmierną aktywnością seksualną, pacjent jest drażliwy; impotencja przy utrzymującym się pożądaniu, przedwczesny wytrysk, nocne polucje, wyciek nasienia, zaburzenia wzrodu (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).

Skład

Selenium metallicum 9 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 2 - 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działanie niepożądane.

Nieznane.

Interakcje

Brak. Lek może być stosowany z innymi lekami homeopatycznymi lub alopacyjnymi.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

W związku z obecnością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją glukozy, niedoborem laktazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy.

W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być zażywany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharozy bądź izomaltazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy.