

## Boiron, Silicea 15CH, granulki 4g



Cena: 15,90 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON

### Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

### Skład

Silicea 15 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 5 ml (około 120 granulek)

### Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 1 - 2 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie. Stosować doustnie, zgodnie z zaleceniem lekarza. Lek przyjmować drogą podjęzykową, trzymając w jamie ustnej do rozpuszczenia # minuty# lub nie wcześniej niż 30 minut po posiłku.

### Wskazania

- Karmienie piersią - kobieta jest osłabiona, drażliwa, źle sypia, jest jej zimno i skarży się na bóle grzbietu podczas karmienia (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).
- Paznokcie - są łamliwe i występują na nich białe plamy (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH)
- Blizny - keloidowe lub pogrubiałe, niebolesne, niezaczerwienione blizny. Występują one u osoby osłabionej, szczupłej, której zawsze jest zimno (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).
- Ból głowy - chory jest osłabiony, cierpi na niedobór składników mineralnych. Ból zlokalizowany jest w okolicy czołowej lub potylicznej, towarzyszy mu uczucie rozszadzenia głowy. Występuje również miejscowa nadwrażliwość owłosionej skóry głowy (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
- Miażdżyca - pacjent jest słaby i ma skłonność do przewlekłych zmian ropnych i demineralizacji (lek stosowany w potencji 9 CH lub 30 CH).
- Powikłania poszczepienne - lek stosowany w przypadku powikłań po szczepieniu BCG (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
- Ropień - lek ułatwia ewakuację ropy, należy go stosować jeżeli ropień nie został opróżniony całkowicie lub występuje skłonność do tworzenia przetoki; sączące zmiany skórne (lek stosowany w potencjach od 9 CH do 30 CH).
- Czyraki - lek stosowany w przypadku procesów przewlekłych i nawracających (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
- Zmiany skórne - obejmują one ropnie, czyraki, liszajec, trądzik ropny, wąglik, zastrzał - wszystkie zmiany mające charakter ropny

- i nawracający (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
- Grzybice skórne - głównie między palcami, u osób ze zwiększoną potliwością skóry (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Pocenie - pot ma intensywny zapach, kwaśny odczyn, jest żrący, najczęściej występuje na stopach i głowie.
  - Parodontoza, zapalno - ropne choroby przyzębia, przedwczesna próchnica (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Złamanie - opóźnienie wzrostu kostnego po złamaniach (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Osteoporoza - występuje skłonność do osteoporozy (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Zapalenie ucha - przewlekłe, ropne zapalenie ucha, nieżyt trąbek słuchowych (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Katar - wielokrotnie nawracające zapalenie błony śluzowej nosa i/lub gardła w okresie jesienno - zimowym (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Angina - wielokrotnie nawracająca w okresach jesienno - zimowych (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Jęczmień - nawracające jęczmienie, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie powiek z wydzielaniem ropnej treści (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Zapalenie układu moczowego - przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej gruczołu krokowego (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
- 
- Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - atoniczne zaparcia, biegunka, zespół złego wchłaniania, skłonność do pasożytów jelitowych (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
- 
- Zaparcia - brak siły wydalającej z odbytu. Powstaje stolec sprężynowy, który wysuwa się a następnie częściowo wraca. Osoba jest wychudzona, osłabiona, pobudzona, zawsze jest jej zimno (lek stosowany w potencjach 5 CH - 30 CH).
  - Biegunka - biegunki i zespół złego wchłaniania (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Robaczyce - występuje skłonność do pasożytów jelitowych, których obecność manifestuje się poprzez napadowy kaszel, bóle w nadbrzuszu, lunatyzm, mimowolne moczenie (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Moczenie nocne - występuje w czasie nowiu księżycy, występuje przy obecności pasożytów jelitowych (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
  - Osłabienie - ogólny brak energii, któremu towarzyszy wyczerpanie umysłowe i uczucie zniechęcenia, trudności ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem. Występuje również po chorobie i przeciążeniu (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Zaburzenia snu - zrywanie się w nocy, lunatyzm. Pacjent jest pobudzony, szczupły i nadwrażliwy na zimno, ze stanami lękowymi i natręctwami (lek stosowany w potencjach 9 CH do 30 CH).
  - Trema i nieśmiałość - szczególnie u typu wrażliwego (lek stosowany w potencji 15 CH i 30 CH).

## Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.