

Boiron, Sulfur 30CH, granulki 4g



Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Wybrane wskazania leku

- Astma - nasila się w nocy, zmniejsza się po otwarciu okna i pod wpływem oddychania świeżym powietrzem. Lek należy podawać w dawkach tygodniowych, w rozcieńczeniu 9 CH, a następnie w rozcieńczeniu 15 CH lub 30 CH. Wraz z występującą poprawą należy zwiększać odstępy czasu pomiędzy przejściami leku (lek stosowany w potencjach od 9 CH - 30 CH).
- Alergia - naczynioruchowy nieżyt błony śluzowej nosa, charakteryzujący się suchością błon śluzowych, niedrożnością nosa, wyciekami piekącej i podrażniającej wydzieliny, częstym kichaniem, świądem nosa (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Świąd - nasilający się w ciepłe łóżka, świerzbiączka, świąd w przebiegu zarażenia świerzbem, zmiany skórne (rumieniowe, pęcherzykowe, sączące lub suche) przebiegające ze świądem (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Wyprysk - atopowy lub kontaktowy (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Opryszczka - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Czyraki - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Jęczmień - zwłaszcza nawracający (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Trądzik - forma krostkowa (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Odmrożenie - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Zapalenie powiek - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Dolegliwości reumatyczne - lek uzupełniający stosowany w podostrych i przewlekłych chorobach reumatycznych dotyczących całego kościa, w tym zapalenie stawów miednicy, ból okolicy lędźwiowej (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).

Skład

Sulfur 30 CH, laktoza jednowodna, sacharoza.

Dawkowanie

Sposób dawkowania ustala się na podstawie wywiadu homeopatycznego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działanie niepożądane

Nieznane.

Interakcje

Brak. Lek może być stosowany z innymi lekami homeopatycznymi lub alopacyjnymi.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

W związku z obecnością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją glukozy, niedoborem laktazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy. W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być zażywany przez osoby z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharozy bądź izomaltazy czy upośledzonym wchłanianiem glukozy.