

Boiron, Thuya occidentalis 15CH, granulki 4g



Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Skład

Thuya occidentalis 15 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 1 - 2 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Wskazania

- Brodawki - swędzą i pieką, są wilgotne i łatwo krwawią. Brodawki umiejscowione są w okolicy potylicy, na brodzie, podbródka, czasem sączy się z nich wilgotna wydzielina (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Trądzik - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Trądzik różowaty - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Czyraki - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Zapalenie gruczołów potowych - lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH.
- Powikłania poszczepienne - lek stosowany jest w celu zapobieżenia powikłaniom po szczepieniu BCG (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Alergia - alergie opóźnione w tym astma oskrzelowa, wyprysk i in. (lek stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH).
- Astma - lek stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH.
- Wyprysk - wyprysk o etiologii alergicznej (lek stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH).
- Angina - nawracające anginy leczone wieloma lekami, przerost migdałków, zapalenie błony śluzowej jam nosowych i nosowej części gardła (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Polipy - błony śluzowej nosa, pęcherza moczowego, włókniaki, torbiele i polipy jajników, policystyczne jajniki (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Zapalenie układu moczowego - zapalenie cewki moczowej, przewlekłe lub nawracające infekcje dróg moczowych (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Upławy - są klejące, zielonkawe i mają przykry zapach m.in. w wyniku rzeżączki (lek stosowany w potencjach 9 CH - 30 CH).
- Nerwobóle - szczególnie w przypadku występowania drżenia mięśni w obrębie obszaru, w którym odczuwane są nerwobóle (lek

stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.