

# Clotrimazolum GSK 10 mg/ g, krem, 20 g

Cena: 6,32 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Producent	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.



## Opis produktu

Clotrimazolum GSK to lek w postaci kremu, który jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Zawiera substancję czynną klotrymazol, która zabija większość grzybów wywołujących zakażenia u człowieka. Klotrymazol należy do pochodnych imidazolu. Lek działa zwłaszcza na drożdżaki i dermatofity.

## Wskazania

- Miejscowe leczenie grzybic skóry rąk i stóp, tułowia, podudzi i nóg wywołanych przez dermatofity.
- Łupież pstry.
- Zakażenia skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez drożdżaki.

## Skład

1 g kremu zawiera:

- substancję czynną: klotrymazol 10 mg,
- substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy, oktylododekanol, polisorbata 60, sorbitanu stearynian, olbrot syntetyczny, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

## Działanie

Przeciwgrzybicze.

## Dawkowanie

- Krem należy nakładać cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca 2-3 razy na dobę.
- Krem należy stosować jednocześnie na wszystkie zakażone miejsca.
- Lek należy stosować przez okres 2-4 tygodni, nawet jeśli objawy choroby ustąpią.

## Przeciwwskazania

- Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
- Cięża.
- Laktacja.
- Klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu, a tym samym osłabiać ich skuteczność.

## Przechowywanie

Przechowywać poza zasięgiem dzieci, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

## Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry. W przypadku nasilenia się objawów podrażnienia lub gdy objawy podrażnienia nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania leku.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
- Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę.
- Nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz zalecanym dawkowaniem i sposobem użycia.