

Clotrimazolum Hasco 10 mg/ g, krem, 20 g

Cena: 4,25 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Opis produktu

Clotrimazolum HASCO to lek w postaci białego kremu do stosowania na skórę. Substancją czynną produktu leczniczego jest klotrymazol - działający miejscowo środek przeciwgrzybiczy. Lek Clotrimazolum HASCO ogranicza rozwój większości grzybów wywołujących zakażenia skóry u ludzi. Zwykle lek stosuje się 2 do 3 razy na dobę. Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa zawierająca 20 g kremu.

Wskazania

- Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, drożdżaki, pleśniaki oraz inne gatunki grzybów: grzybica stóp, grzybica dłoni, grzybica skóry tułowia, grzybica pachwin, łupież pstry.
- Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (Candida vulvitis i balanitis).

Skład

1 g kremu zawiera:

- substancję czynną: 10 mg klotrymazolu,
- substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian, polisorbat 60, palmitynian cetylu, alkohol cetostearylowy, alkohol benzylowy,

oktylododekanol, woda oczyszczona.

Działanie

Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie

- 2 do 3 razy na dobę nanieść cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca i delikatnie go w nie wcierać.
- Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, lek należy stosować jeszcze co najmniej przez miesiąc.
- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
- W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Leku Clotrimazolium HASCO nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- dopochwowo.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

- Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- Stosowany na skórę klotrymazol jest dobrze tolerowany. Rzadko mogą wystąpić reakcje skórne (rumień, zaczerwienienie, pieczenie skóry, pokrzywka, krostki, złuszczenie naskórka, podrażnienie).

- Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, ból oraz świąd i wysypka. Niekorzystne zmiany skórne wywołane stosowaniem leku mają charakter przemijający i zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

Interakcje

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Klotrymazol zmniejsza skuteczność amfoterycyny i innych antybiotyków polienowych (np. nystatyny, natamycyny). Jednocześnie stosowane miejscowo preparaty zawierające silnie działające steroidy osłabiają działanie klotrymazolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Clotrimazolum HASCO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Klotrymazol stosowany miejscowo może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i kążki dopochwowe). Dlatego podczas stosowania leku na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych i co najmniej przez 5 dni po zaprzestaniu jego stosowania, nie należy używać mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami i ustami.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne. Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy stosować leku dopochwowo. W okresie karmienia piersią lek może być stosowany tylko w przypadkach uzasadnionych, pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Clotrimazolum HASCO zawiera alkohol cetostearylowy

- Lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).