

Contractubex (50 j.m. +100 mg + 10 mg)/g, żel na blizny, 20 g



Cena: 32,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(0,01g+0,1g+50j.m.)/g
Producent	MERZ & CO.GMBH

Opis produktu

Działanie

Hamuje proliferację fibroblastów i nadmierną syntezę kolagenu, przez co wpływa na tworzenie prawidłowej tkanki łącznej i ogranicza przerastanie blizny. Poprawia ukrwienie i nawilżenie tkanki, zmniejszając uczucie napięcia i świądu. Działa zmiękczająco, co powoduje większą elastyczność blizny.

Wskazania

- Blizny ograniczające ruch
- powiększone (hipertro-ficzne),
- obrzmiałe (o kształcie bliznowca) oraz nieestetyczne blizny pooperacyjne,
- po amputacjach,
- blizny pooparzeniowe i powypadkowe
- Usztywnienie stawów (przykurcz) np. palców (przykurcz Dupuytren), a także (urazowe) przykurczę ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, ostrożnie wcierać Contractubex w tkankę blizny kilka razy dziennie, aż do całkowitego wchłonięcia żelu przez skórę. W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych ewentualnie nałożyć na noc opatrunek z lekiem. W zależności od rozległości i grubości blizny bądź przykurczu, leczenie może trwać kilka tygodni i miesięcy. Przy świeżych bliznach należy rozpocząć

kurację Contractubexem możliwie wcześnie, kilka dni po powstaniu urazu bądź po operacji - zaraz po zrośnięciu się rany, nanosząc ostrożnie żel na delikatną nowo powstałą tkankę. Natomiast w przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych należy Contractubex silnie wcierać oraz zintensyfikować działanie leku przy pomocy opatrunku z żelem. W trakcie leczenia świeżych blizn unikać przede wszystkim bodźców fizycznych jak np. ekstremalnego zimna bądź promieniowania ultrafioletowego lub zbyt silnego wcierania.

Skład

1 g żelu zawiera: substancje czynne: heparynę 50j.m., ekstrakt płynny z cebuli 100mg, alantoinę 10mg oraz substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona.