

Esseliv Forte 300 mg, 50 kapsułek twardych

Cena: 22,92 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,3 g
Postać	kaps.twarde
Producent	AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Opis produktu

Esseliv forte to lek wydawany bez przepisu lekarza w postaci twardych kapsułek do doustnego stosowania, wskazany w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby (w tym: w przewlekłym zapaleniu wątroby oraz w uszkodzeniach wątroby po spożyciu alkoholu, leków, toksyn). Może być również stosowany wspomagająco w leczeniu zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Esseliv forte zawiera pozyskiwane z nasion soi fosfolipidy niezbędne (Phospholipidum essentiale). Składnikiem fosfolipów jest polienylofosfatydylocholina - substancja zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Obecne w produkcie leczniczym Esseliv forte fosfolipidy przedostają się do wątroby, gdzie wykazują zdolność wbudowywania się w błony komórek wątrobowych i przyczyniają się do uzupełnienia istniejących niedoborów powstałych na skutek choroby oraz wpływają na uszkodzone komórki wątrobowe, przyspieszając ich odnowę (regenerację).

Wskazania

- Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym: przewlekłe zapalenie wątroby, toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby, poalkoholowe uszkodzenia wątroby.
- Wspomagająco w leczeniu zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Skład

1 kapsułka twarda zawiera:

- substancja czynna: fosfolipidy z nasion soi (Phospholipidum essentiale) 300 mg,
- pozostałe składniki: olej sojowy, tłuszcz utwardzony, wanilina. Składniki kapsułki twardej żelatynowej: żelatyna, indygotyna (E 132), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Działanie

Zawarte w leku fosfolipidy uzupełniają w błonach komórek wątrobowych istniejące ubytki, które powstały wskutek choroby, i wpływają na szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.

Dawkowanie

Lek Esseliv forte należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli: 2 kapsułki (600 mg) 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek (1800 mg) na dobę. Po 2-3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą: 1 kapsułek (300 mg) 3 razy na dobę.
- Niemowlęta: stosować dawkę 300 mg na 10 kg mc. na dobę (1 kapsułka na 10 kg mc.). Średnio stosuje się 3 do 6 kapsułek (900 mg do 1800 mg) na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę (1800 mg).

Lek należy przyjmować doustnie w trakcie posiłku. Jeżeli dziecko nie potrafi połknąć kapsułki, należy wycisnąć jej zawartość do niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody. Lek należy stosować przez minimum 3 miesiące. Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem. W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Brak danych dotyczących przedawkowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na fosfolipidy z nasion soi lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Lek ten, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, co nie oznacza, że u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

- łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, rozwolniony stolec, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje leku Esseliv forte z innymi lekami nie są znane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed przyjęciem leku powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Odpowiednie badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostały wykonane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Esseliv forte zawiera olej sojowy

- Ze względu na zawartość oleju sojowego nie stosować leku w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

