

## Excedrin Migra Stop, 20 tabletek

Cena: 41,97 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,25g+0,25g+0,065g
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

### Opis produktu

**Wskazania:** w doraźnym leczeniu bólu głowy oraz napadów migreny (# światło i dźwięk) z aurą lub bez aury.

**Skład:** 1 tabletkę zawiera: substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 250mg, paracetamol 250mg, kofeinę 65mg; inne składniki leku: rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy; otoczka Opadry Ys-1-7086: hypromeloz, dwutlenek tytanu (E171), glikol propylenowy, kwas benzoowy (E210), wosk Carnauba.

**Działanie:** kwas acetylosalicylowy i paracetamol zmniejszają ból i gorączkę, a kwas acetylosalicylowy dodatkowo działa przeciwzapalnie. Kofeina jest łagodnym środkiem pobudzającym i zwiększa działanie kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu.

**Dawkowanie:** dorośli: leczenie bólu głowy: 1 tabletkę popić pełną szklanką wody. W razie konieczności kolejną tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej intensywnego bólu głowy można wziąć jednorazowo 2 tabletki, w razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin od zażycia dwóch pierwszych tabletek. Dorośli: leczenie migreny: dwie tabletki popić szklanką wody. W razie konieczności można przyjąć kolejne dwie tabletki zachowując 4-6 godzinny odstęp między dawkami. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek w ciągu doby.

**Przeciwwskazania:** uczulenie na którykolwiek ze składników leku, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroby krwi, niewydolność serca, niewydolność wątroby lub nerek, stosowanie leku metotreksat, ciąża, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, astma oskrzelowa, skaza moczanowa, cukrzyca, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, alkoholizm, odwodnienie, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat, ciąża, laktacja.