

# Flegamina Junior 2 mg/ 5 ml, smak truskawkowy, syrop, 200 ml



Cena: 27,65 PLN

## Opis słownikowy

|           |   |
|-----------|---|
| Dawka     | 2 mg/5ml                                |
| Producent | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O. |

## Opis produktu

### Wskazania

Syrop o smaku truskawkowym Flegamina Junior przeznaczony jest do stosowania w przypadku ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Do stosowania u dzieci powyżej 2 roku życia

### Właściwości

Flegamina Junior syrop o smaku truskawkowym to skuteczny lek wykrztuśny upłynniający wydzielinę z dróg oddechowych. Swoje działanie zawdzięcza on substancji czynnej chlorowodoru bromoheksyny. Syrop Flegamina Junior o smaku truskawkowym ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Ma też działanie rozrzedzające na wydzielinę. Syrop Flegamina Junior posiada przyjemny dla dziecka smak truskawki. Dzięki temu dziecko chętniej przyjmie lek w czasie choroby.

### Skład

Substancją czynną syropu Flegamina Junior o smaku truskawkowym jest bromoheksyny chlorowodorek. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza, glicerol, metyl parahydroksybenzoesan, aromat truskawkowy, koszenila w postaci 7,5% roztworu barwnika, woda oczyszczona.

### Stosowanie

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 10 ml syropu Flegamina Junior o smaku truskawkowym (odpowiednik 2 łyżeczek do herbaty) 2 razy na

dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml 3 razy na dobę. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 20 ml syropu 3 razy na dobę. Syrop Flegamina Junior o smaku truskawkowym należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Syropu Flegamina Junior o smaku truskawkowym, ze względu na zawartość bromoheksyny, nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

### **Przeciwwskazania**

Ze względu na zawartość bromoheksyny, nie należy stosować leku Flegamina Junior o smaku truskawkowym u dzieci poniżej 2 lat.