

Flegamina o smaku miętowym bez cukru, 200ml



Cena: 27,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka	4 mg/5ml
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Opis produktu

Wskazania

Flegamina bez cukru - Syrop o smaku miętowym 4 mg/5 ml to produkt zalecany do stosowania w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu, typu:

- choroby oskrzeli z gęstą,
- nadmiernie lepłą wydzieliną,
- przewlekłe zapalenie oskrzeli,
- mukowiscydoza,
- niedodma w wyniku zamknięcia oskrzeli przez śluz,
- powikłania płucne po operacjach i w przebiegu anestezji.

Syrop nadaje się również do stosowania po zabiegach diagnostycznych na drzewie oskrzelowym. Przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 7. roku życia.

Właściwości

Flegamina Syrop o smaku miętowym zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który jest jego substancją czynną. Bromoheksynę cechuje

- działanie mukolityczne i wykrztuśne.
- działa rozrzedzająco na wydzielinę w drzewie oskrzelowym
- pobudza gruczoły do produkcji mniej lepkiego śluzu.
- zwiększa ilość wydzieliny, ułatwiając odkrztuszanie oraz oczyszczanie i udrażnianie dróg oddechowych.

Bromoheksydyna tłumi męczący kaszel i ułatwia oddychanie. Szybko się wchłania z przewodu pokarmowego. Flegamina syrop jest więc lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek nie zawiera cukru. Zawiera sorbitol. Zawiera też alkohol - etanol 96% (1 łyżeczka do herbaty, 5ml, zawiera do 174mg etanolu). Smak miętowy.

Skład

substancja czynna: bromoheksyny chlorowodorek

pozostałe składniki: glukoza jednowodna, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, lewomentol, substancja poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo płynna, błękit patentowy (E 131), kurkuma, kwas solny, woda oczyszczona

Stosowanie

Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

- Dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty) 3 razy na dobę.
- Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty) 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ważne informacje

Lek niewskazany w przypadku nadwrażliwości na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Flegaminy w syropie nie należy stosować u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.