

Flegtac Kaszel 1,6 mg/ ml, syrop, 200ml



Cena: 18,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1,6 mg/ml
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Opis produktu

Flegtac Kaszel 125 ml to lek w postaci przezroczystego, bezbarwnego syropu o charakterystycznym wiśniowym zapachu, odpowiedni dla osób dorosłych oraz dzieci po 2. roku życia. Substancją czynną tego leku jest bromoheksyny chlorowodorek (Bromhexini hydrochloridum), który działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę w drogach oddechowych i ułatwia rześkom jej transport z płuc. W efekcie syrop ułatwia odkaszlanie i łagodzi kaszel. Butelka o zawartości 125 ml została wykonana ze szkła oranżowego typu III. Do opakowania została dołączona również łyżka miarowa z podziałką: 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml i 5 ml.

Wskazania

Lek Flegtac Kaszel stosuje się u dzieci po 2. roku życia i dorosłych:

- w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, które przebiegają z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: bromoheksyny chlorowodorek 1,6 mg,
- substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekryształizujący (E420) w ilości 760 mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40 mg/ml,

metylu parahydroksybenzoesan (E218) w ilości 0,90 mg/ml, propylu parahydroksybenzoesan (E216) w ilości 0,10 mg/ml, sacharyna sodowa (E954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol propylenowy, alkohol benzylový, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2-metylo-4-piron (maltol), aldehyd anyżowy, kwas benzoesowy).

Działanie

Wykrztuśne, upłynnijające wydzielinę.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku:** 5 ml (1 pełna łyżka miarowa) syropu, 3 razy na dobę, nie więcej niż 30 ml/dobę.
- **Dzieci powyżej 12. roku życia:** 5 ml (1 pełna łyżka miarowa), 3 razy na dobę, nie więcej niż 30 ml/dobę.
- **Dzieci od 6. do 12. roku życia:** 2,5 ml (podziałka ½ na łyżce miarowej), 3 razy na dobę, nie więcej niż 10 ml/dobę.
- **Dzieci od 2. do 6. roku życia:** 1,25 ml (podziałka ¼ na łyżce miarowej), 3 razy na dobę, nie więcej niż 5 ml/dobę.

Stosowanie leku Flegtac Kaszel

- Sposób podawania: doustne.
- Syrop zażywa się w równych odstępach czasu, po posiłku.
- Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.
- W przypadku przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub dowolny z pozostałych składników tego leku.
- Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
- Wrodzona nietolerancja fruktozy.
- Nie podawać dzieciom poniżej 2. roku życia.

Przechowywanie

Syrop Flegtac Kaszel należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu (w celu ochrony przed światłem słonecznym), oraz w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

- Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, w tym objawów niewymienionych w ulotce dołączonej do opakowania, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
- W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z

lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala, szczególnie w przypadkach:

- ciężkich działań niepożądanych dotyczące skóry (w tym: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, ostra uogólniona krostkowica),
- reakcji alergicznych (w tym: wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub połykaniu),
- innych działań niepożądanych o ciężkim przebiegu.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka,
- wysypka, pokrzywka,
- reakcje nadwrażliwości.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

- ból głowy, zawroty głowy,
- senność.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- niestrawność,
- nadmierne pocenie się,
- ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica),
- reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny),
- obrzęk naczynioruchowy i świąd,
- obniżenie ciśnienia krwi,
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AST i ALT.

Interakcje

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Flegtac Kaszel równocześnie z atropiną lub innymi lekami cholinolitycznymi, ponieważ powodują one suchość błon śluzowych.
- Nie należy podawać leku Flegtac Kaszel równocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ na skutek osłabionego odruchu kaszlowego może wystąpić niebezpieczne nagromadzenie wydzieliny oskrzelowej.
- Bromoheksyna może wzmacniać drażniące działanie salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
- Równoczesne stosowanie bromoheksyny i antybiotyków (w tym: amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny, doksycykliny, oksytetracykliny i ampicyliny) może skutkować zwiększeniem stężenia antybiotyku w płucach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek ma postać przezroczystego, bezbarwnego syropu. Jeżeli syrop jest mętny, nie należy go stosować.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Flegtac Kaszel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadkach:
 - stanu zapalnego dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym (wówczas lek Flegtac Kaszel należy zażywać równocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami, które rozszerzają drogi oddechowe; przez cały okres leczenia należy dużo pić, a zwłaszcza w przypadkach wystąpienia gorączki, ponieważ odpowiednie

nawodnienie organizmu wspiera proces rozrzedzania wydzieliny oskrzelowej i ułatwia jej odkrztuszenie),

- ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
 - chorowania na astmę,
 - zaburzeń czynności motorycznej oskrzeli (np. dyskineza rzęsek),
 - zaburzeń czynności wątroby lub nerek,
 - trudności z odkrztuszeniem.
- Znane są przypadki ciężkich reakcji skórnych powiązanych ze stosowaniem substancji czynnej leku – bromoheksyny. W przypadku wystąpienia wysypki (w tym pęcherzy i zmian na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu lub narządów płciowych), należy niezwłocznie przerwać stosowanie syropu Flegtac Kaszel i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 - Jeśli po upływie 7 dni od rozpoczęcia przyjmowania leku nie nastąpiła poprawa, albo jeśli nastąpiło pogorszenie, należy udać się do lekarza.
 - W sytuacji pominięcia dawki leku, należy zażyć ją niezwłocznie, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takiej sytuacji nie należy uzupełniać dawki, a raczej przyjmować lek od następnej dawki, zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 - Lek Flegtac Kaszel zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), i może powodować reakcje alergiczne (również reakcje typu późnego).
 - 1 ml syropu zawiera 760 mg sorbitolu (E420) o wartości kalorycznej 2,6 kcal/g sorbitolu. Sorbitol jest źródłem fruktozy. W przypadku nietolerancji niektórych cukrów lub dziedzicznej nietolerancji fruktozy nie należy przyjmować tego leku. Ponadto sorbitol może powodować dyskomfort w układzie pokarmowym i mieć łagodne działanie przeczyszczające.
 - Lek zawiera 40 mg glikolu propylenowego w 1 ml.
 - W przypadku dodatkowych pytań związanych z lekiem lub jego stosowaniem należy zwrócić się do farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować tego leku u dzieci poniżej 2. roku życia.
- Przed rozpoczęciem stosowania syropu Flegtac Kaszel u dzieci powyżej 2. roku życia należy skonsultować to z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

- Będąc w ciąży lub karmiąc piersią, przypuszczając bycie w ciąży lub planując dziecko należy przed zastosowaniem leku Flegtac Kaszel poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Stosowanie leku w pierwszym trymestrze ciąży nie jest wskazane.
- W drugim i trzecim trymestrze lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy lekarz zdecyduje, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
- W okresie karmienia piersią należy przed zastosowaniem tego leku poradzić się lekarza. Bromoheksyna przenika do mleka ludzkiego, ale nie ma wystarczających informacji dotyczących wpływu bromoheksyny na organizm noworodków i małych dzieci. Lekarz zdecyduje, czy lepiej przerwać karmienie piersią, czy zaniechać stosowanie leku Flegtac Kaszel.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu bromoheksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
- Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

