

## Flonidan Control 10mg, 10 tabletek

Cena: 9,30 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Producent	SANDOZ GMBH

### Opis produktu

Flonidan Control jest lekiem przeciwalergicznym stosowanym w łagodzeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, takich jak świąd skóry i pokrzywka.

#### Wskazania

Flonidan Control stosuje się w leczeniu objawów alergicznych, takich jak:

- alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,
- przewlekła pokrzywka idiopatyczna.

#### Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancja czynna: loratadynę 10mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna.

#### Działanie

Lek o działaniu przeciwalergicznym, łagodzący objawy reakcji alergicznej.

## Dawkowanie

- **Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:** 1 tabletkę dziennie.
- **Dzieci w wieku od 2 do 12 lat (o masie ciała większej niż 30 kg):** 1 tabletkę (10 mg) raz na dobę.
- Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
- Tabletkę należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.

## Przeciwwskazania

- Uczulenie na loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat ani u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.

## Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Chronić przed wilgocią.

## Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- ból głowy, nerwowość i uczucie zmęczenia (u dzieci),
- senność (u dorosłych i młodzieży).

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- ból głowy,
- zwiększenie apetytu,
- zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy - obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów),
- ciężkie reakcje alergiczne z nagłym utrudnieniem oddychania, bardzo ciężkimi zawrotami głowy lub zapaścią, obrzękiem twarzy lub gardła (anafilaksja). W razie wystąpienia opisanych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szukać pomocy medycznej,
- przyspieszona czynność serca,
- kołatanie serca,
- zapalenie błony śluzowej żołądka,
- nudności,
- zaburzenia czynności wątroby,
- suchość w jamie ustnej,
- zawroty głowy,
- uczucie zmęczenia,
- wysypka,
- wypadanie włosów,
- drgawki.

## Interakcje

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował niżej wymienione leki:

- cymetydyna (lek stosowany w celu zmniejszenia wydzielania kwasu solnego w żołądku),
- ketokonazol lub flukonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych),
- erytromycyna (antybiotyk),

- fluoksetyna (lek stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych).

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jedna tabletkę zawiera 69,175 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Jedna tabletkę leku Flonidan Control zawiera mniej niż 0,01 WW.
- Nie wykazano, aby loratadyna działała szkodliwie na płód lub na noworodka, ale w celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania leku Flonidan Control u kobiet w ciąży.
- Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania leku Flonidan Control w okresie karmienia piersią.
- Lek stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Jednak u niektórych osób przyjęcie leku może spowodować senność zaburzającą zdolność wykonywania tych czynności.
- Może być konieczne zmniejszenie dawki leku, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Przed zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, który zaleci właściwe dawkowanie.
- Jeśli po przyjęciu leku Flonidan Control objawy alergii nie ustępują lub nawet nasilają się, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Jeśli pacjent ma mieć wykonywane alergiczne testy skórne, konieczne jest przerwanie stosowania leku co najmniej na 2 dni przed wykonaniem testu w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Po wykonaniu badania lek można przyjmować tak jak poprzednio.
- Należy omówić z lekarzem jeśli lek stosowany jest przez długi czas.