

## Folik 0,4 mg, 90 tabletek

Cena: 19,67 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,4 mg
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

### Opis produktu

Substancją czynną leku Folik jest kwas foliowy, który jest witaminą z grupy B. Zapotrzebowanie na kwas foliowy zwiększa się w czasie ciąży i podczas karmienia piersią, w okresie zwiększonego zapotrzebowania dieta może być niewystarczającym źródłem kwasu foliowego.

### Wskazania

Lek Folik stosuje się w celu:

- zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży,
- zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa.

### Skład

#### 1 tabletkę zawiera:

- substancja czynna: kwas foliowy 0,4mg,
- pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat Maracuja.

#### Działanie

Uzupełnienie niedoborów kwasu foliowego w organizmie, zapobieganie wystąpieniu wad wrodzonych płodu.

#### Dawkowanie

- Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletkę raz na dobę, co najmniej przez jeden miesiąc przed poczęciem i w pierwszym trymestrze (pierwsze 3 miesiące).
- Tabletkę najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, popijając wodą.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

#### Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować co najmniej u 1 na 1000 osób):

- skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd).

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować co najmniej u 1 na 10 000 osób):

- gorzki smak w ustach,
- wzdęcia,
- nudności,
- wymioty,
- biegunka,
- brak łaknienia,

- trudności w zasypianiu,
- senność,
- nadmierna pobudliwość nerwowa,
- depresja.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować poniżej 1 na 10 000 osób):

- obrzęk naczynioruchowy,
- skurcz oskrzeli.

Z częstością nieznaną występuje:

- ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna).

## Interakcje

Działanie leku Folik może zostać zmniejszone, stosując jednocześnie:

- doustne środki antykoncepcyjne (zawierające estrogeny),
- leki przeciwgruźlicze,
- alkohol i żywice jonowymienne.

Działanie leku Folik może zostać zmniejszone, ale na skutek odmiennego mechanizmu, stosując jednocześnie:

- leki znane jako antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprim, pirymetamina, sulfasalazyna),
- leki przeciwnowotworowe (metotreksat).

Stosowanie leku Folik jednocześnie z niżej wymienionymi lekami może zmniejszyć ich skuteczność, prowadząc do nawrotu drgawek:

- leki przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoina, prymidon).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Z wyjątkiem okresu ciąży i laktacji nie należy stosować kwasu foliowego w dawkach większych niż 0,4mg na dobę. Bez uprzedniego wykluczenia przez lekarza niedokrwistości megaloblastycznej.
- Kobiety, które urodziły dziecko z wadą wrodzoną układu nerwowego, są obciążone zwiększonym ryzykiem urodzenia kolejnego dziecka z taką wadą. Przed kolejną ciążą powinny uzyskać poradę genetyczną. Takie kobiety powinny stosować kwas foliowy przez co najmniej trzy miesiące przed planowaną ciążą, w dawkach 4 do 5mg na dobę.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku Folik jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
- Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjentka czuje się lepiej.