

Groprinosin Forte 1000 mg, lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność, 10 tabletek



Cena: 21,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 g
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

- Leczenie opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).
- Wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Skład

1 tabletką zawiera:

- substancję czynną: inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3) 1000 mg,
- pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Działanie

Przeciwwirusowe i wspomagające odporność.

Dawkowanie

- **Dorośli:** zazwyczaj 1 tabletkę 3 razy na dobę (zalecana dawka to 50 mg/ kg masy ciała na dobę).
- **Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia*:** zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.
- Lek należy przyjmować doustnie, popijając tabletkę odpowiednią ilością płynu, najlepiej wodą.
- W przypadku trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

Maksymalna dawka dobową dla osób dorosłych to 4 tabletki (4 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 4 razy na dobę). Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1-2 dni. Jeśli po upływie 5-14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza

Przeciwwskazania

- Uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Napad dny moczanowej) lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi podczas badań.
- Nie stosować u dzieci w 1 roku życia.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Lek Groprinosin Forte jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Każdy lek może wywołać reakcję alergiczną, jednakże ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku Groprinosin Forte występują bardzo rzadko.
- Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia:
 - nagle pojawiającego się świszczącego oddechu,
 - trudności w oddychaniu,
 - obrzęku powiek, twarzy, warg,
 - wysypki lub świądu (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

- zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu.

Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- nudności z wymiotami lub bez, ból brzucha,

- swędzenie skóry, wysypka skórna (jako jedyny objaw),
- bóle głowy, zawroty głowy,
- zmęczenie lub złe samopoczucie,
- bóle stawów.

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

- biegunka, zaparcia,
- nerwowość,
- senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),
- zwiększona objętość moczu (wielomocz). Częstość nieznana (nie może być określana na podstawie dostępnych danych):
- ból w nadbrzuszu,
- obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioworuchowy),
- pokrzywka, reakcja alergiczna, nagła reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna), wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry (rumień).

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności o lekach, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Groprinosin Forte, tj.:

- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej,
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne,
- leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne),
- azydotymidyna.

Częstość nieznana (nie może być określana na podstawie dostępnych danych):

- ból w nadbrzuszu,
- obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioworuchowy),
- pokrzywka, reakcja alergiczna, nagła reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna), wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry (rumień).

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności o lekach, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Groprinosin Forte, tj.:

- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej,
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne,
- leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne),
- azydotymidyna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- *Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek, zaleca się podawanie leku Groprinosin Forte w syropie.
- Rozpoczęcie stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w szczególności:
 - jeżeli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego w krwi lub w moczu,
 - jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
 - jeżeli leczenie jest długotrwałe (3 miesiące lub dłużej, gdyż podczas długotrwałego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe).
- W przypadku zaobserwowania objawów reakcji alergicznej, takich jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży i karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Groprinosin Forte jest lekiem o działaniu przeciwwirusowym oraz dodatkowo zwiększającym odporność organizmu. Tabletki zawierają w składzie inozyny pranobeks, który pozwala zahamować namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes (w warunkach in vitro). Dodatkowo preparat pobudza czynność układu odpornościowego. Lek może być stosowany u dorosłych jak i u dzieci powyżej 1 roku życia* wspomagająco w okresie obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych jak również w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Preparat wskazany jest wyłącznie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.