

Groprinosin Forte 500 mg/ 5 ml, syrop dla dzieci powyżej 1 roku i dorosłych, smak malinowy, 150 ml

Cena: 24,39 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,5 g/5ml
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Opis produktu

Groprinosin Forte to lek w postaci syropu o smaku malinowym o działaniu przeciwwirusowym. Preparat dodatkowo pobudza czynność układu odpornościowego, zwiększając wytrzymałość organizmu na infekcje. Substancją czynną leku jest inozyna w postaci pranobeksu, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Syrop Groprinosin Forte stosowany jest wspomagająco u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 1 roku życia o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Preparat jest również wykorzystywany w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Groprinosin Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w sytuacji nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- Leczenie opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: inozyny pranobeks 10 mg,
- pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), maltitol ciekły (E 965) (maltitol, sorbitol), sacharyna sodowa (E 954), sukraloza (E 955), sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, aromat malinowy L-144739 (cukry, glikol propylenowy, etanol, naturalne substancje aromatyzujące) oraz aromat malinowy 10721-31 (dietylu malonian, etylu octan, aldehyd octowy, trans-2 heksanal, β -Damascenon, maltodekstryna skrobiowa, guma arabska).

Działanie

Przeciwwirusowe i immunostymulujące.

Dawkowanie

- **Dorośli, w tym osoby powyżej 65 lat:** zwykle 30 ml/ 3 g syropu na dobę (50 mg/ kg masy ciała na dobę/ 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych.
- Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę (czyli 40 ml syropu na dobę).
- **Dzieci powyżej 1 roku życia:** w zależności od masy ciała (50 mg/kg masy ciała na dobę/ 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby:
 - **10-14 kg:** 3 x 2,5 ml,
 - **15-20 kg:** 3 x 2,5-3,5 ml,
 - **21-30 kg:** 3 x 3,5-5 ml,
 - **31-40 kg:** 3 x 5-7,5 ml,
 - **41-50 kg:** 3 x 7,5-9 ml.
- Lek należy stosować doustnie, odmierzając odpowiednią dawkę za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

Lek należy przyjmować 5-14 dni, a po ustąpieniu objawów stosowanie zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy zwrócić się do lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku (objawami reakcji alergicznej mogą być wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka).
- Występowanie aktualnie u pacjenta napadów dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi w wykonanym badaniu.
- Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze do 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.
- Po pierwszym otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Działania niepożądane

Groprinosin Forte, jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia:

- nagle pojawiającego się świszczącego oddechu,
- trudności w oddychaniu,
- obrzęku powiek, twarzy, warg,
- wysypki lub świądu, w szczególności dotyczących całego ciała).

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

- zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu.

Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- bóle głowy i/lub zawroty głowy,
- zmęczenie lub złe samopoczucie,
- nudności z możliwymi wymiotami i/lub dyskomfort w nadbrzuszu,
- świąd skóry, wysypka skórna (jako jedyny objaw),
- bóle stawów.

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

- senność lub trudności w zasypianiu,
- biegunka, zaparcia,
- wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu),
- nerwowość.

Częstość nieznaną (nie może być określana na podstawie dostępnych danych):

- ból w nadbrzuszu,
- obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioworuchowy),
- pokrzywka, reakcja alergiczna, nagła reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna), wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry (rumień).

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności o lekach, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Groprinosin Forte:

- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej,
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne,
- leki hamujące czynność układu odpornościowego, (immunosupresyjne).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy w szczególności omówić stosowanie leku z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- gdy u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego w krwi lub w moczu,
- gdy u pacjenta występowała w przeszłości kamica nerkowa,
- gdy u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
- gdy zaobserwowano objawy reakcji alergicznej, takiej jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka (w takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem).
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy przyjmować leku Groprinosin Forte w okresie ciąży i karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Jest mało prawdopodobne, aby lek Groprinosin Forte miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Groprinosin Forte zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Lek Groprinosin Forte zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 30 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.