

# Gynoxin Optima - na zakażenia grzybicze pochwy, 3 kapsułki dopochwowe

Cena: 36,21 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	0,2 g
Producent	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A

## Opis produktu

Pierwsze kapsułki dopochwowe z substancją o szerokim działaniu przeciwgrzybiczym fentikonazolem.

**Wskazania:** grzybicze zapalenie pochwy i sromu nazywane też drożdżycą pochwy i sromu

**Sposób użycia:** 1 kapsułka dopochwowa, miękka stosowana raz na dobę przez trzy kolejne dni. Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin Optima są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie.

**Działania niepożądane:** jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia. Jeśli lek Gynoxin Optima jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania i występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

**Ważne wskazówki:** stosowanie Gynoxin Optima należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz „Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność”),
- jednocześnie stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu. W czasie stosowania tego leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji
- wystąpią reakcje nadwrażliwości na lek
- objawy nie zmniejszą się w ciągu 24 godzin lub się nasilą,
- partner uległ również zarażeniu,

- u pacjentki wystąpiły więcej niż dwa zakażenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową,
- jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- pacjentka nie ukończyła jeszcze 16. roku życia,
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:
  - nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
  - upławy zabarwione krwią,
  - rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
  - ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu,
  - działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z leczeniem.

W przypadku rozgryzienia i # połknięcia kapsułki dopochwowej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala

**Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.**