

Hascovir control max 400mg, 60 tabletek

Cena: 67,71 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Opis produktu

Hascovir Control Max 400 mg to lek w postaci białych niepowlekanych tabletek, zawierający substancję czynną acyklowir, który działa poprzez hamowanie namnażania się wirusów z grupy Herpes. Hascovir Control Max przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe w celu zapobiegania nawrotom opryszczki pospolitej. Lek może być stosowany wyłącznie przez pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Wskazania

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: acyklowir 400 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Działanie

Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** doustnie 1 tabletkę dwa razy na dobę, co 12 godzin.
- Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na światło słoneczne, stres, gorączka).

Przeciwwskazania

- Leku nie powinien być przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.
- Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie należy stosować leku przez osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV)

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

- bóle i zawroty głowy,
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
- świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego),
- zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

- niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi),
- pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezdolność do ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychiatryczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka,
- zapalenie wątroby, żółtaczka,
- ostra niewydolność nerek.

Interakcje

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować w szczególności jeśli jest to:
 - probenecyd - lek stosowany w dnie moczanowej,
 - cymetydyn - lek stosowany głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
 - mykofenolan mofetylu - lek stosowany po przeszczepach narządów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Hascovir control MAX bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:

- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,
- u pacjentów, którzy stosują inne leki mogące uszkodzić nerki,
- u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub starszych),
- u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią,
- u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa,
- w przypadku zauważenia częstych (powyżej 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (między innymi gdy po 3-4 dniach leczenia powstają nowe ogniska zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku.

Podczas stosowania leku należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

- Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, iż korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
- Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany wówczas jedynie po konsultacji z lekarzem.

Lek Hascovir control MAX zawiera laktozę i sól

- Jeśli pacjent ma stwierdzoną nietolerancję niektórych cukrów, powinien przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem.