



## Dawkowanie

Lek Ibum Forte należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Dawka dobową syropu przeciwgorączkowego jest ściśle uzależniona od masy ciała.

- **Dzieci w wieku 3-6 miesięcy (5-7,6 kg):** 1,25 ml (50 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 6-12 miesięcy (7,7-9 kg):** 1,25 ml (50 mg) maksymalnie 3-4 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 1-3 lat (10-15 kg):** 2,5 ml (100 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 4-6 lat (16-20 kg):** 3,75 ml (150 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 7-9 lat (21-29 kg):** 5 ml (200 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg):** 7,5 ml (300 mg) maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci powyżej 40 kg:** 7,5 -10 ml (300-400 mg) maksymalnie 3-4 razy po 7,5 ml na dobę.

Lek należy podawać w odstępach co najmniej 6-godzinnych. U niemowląt poniżej 6 miesiąca życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem. Nie można stosować większej dawki niż zalecana. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

## Wskazania

Lek Ibum Forte 200 mg/ 5 ml stosuje się u dzieci od 3 miesiąca życia w przypadku, gdy występuje:

- gorączka różnego pochodzenia, w tym w przebiegu grypy, przeziębienia, oraz odczynu poszczepiennego,
- ból różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, taki jak:
  - ból głowy, gardła i mięśni,
  - ból zębów, ból po zabiegu stomatologicznym, ból na skutek ząbkowania,
  - ból stawów i kości, powstały na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),
  - ból wynikający z urazów tkanek miękkich,
  - ból pooperacyjny,
  - ból uszu występujący w stanach zapalnych ucha środkowego.

## Przeciwwskazania

- Uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Czynna lub przebyta choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją (przedziurawieniem) lub krwawieniem, również występującym po zastosowaniu NLPZ.
- Występowanie w przeszłości u pacjenta jakichkolwiek objawów alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej w trakcie leczenia, gdzie stosowano kwas acetylosalicylowy lub inny niesteroidowy lek przeciwzapalny.
- Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.
- Krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie.
- Zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.
- Ostatnie trzy miesiące ciąży.

## Skład

**5 ml zawiesiny Ibum Forte zawiera:**

- substancję czynną: ibuprofen 200 mg
- substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma, ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat truskawkowy, woda oczyszczona.