

Intesta Max, na poprawę pracy jelit, 30 saszetek



Cena: 38,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BIOLEK SP. Z O.O.

Opis produktu

Intesta Max to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosowany do postępowania dietetycznego, gdy występuje:

- Zespół jelita nadwrażliwego (IBS),
- Zaburzenia jelitowe przy nietolerancji leków (np. leków z metforminą stosowanej przy leczeniu cukrzycy),
- Biegunka i objawy zaburzeń jelitowych wywołane przez stosowanie antybiotyków, radioterapię, chemioterapię oraz drobnoustroje,
- Zabiegi chirurgiczne na jelitach,
- Choroba uchyłkowa jeli,
- Choroby zapalne jeli,
- Podróż do miejsc o niższym standardzie higienicznym,
- Dieta ze zbyt małą zawartością błonnika pokarmowego.

Głównym składnikiem preparatu jest **maślan sodu**, który uzupełnia niedobory endogennego kwasu masłowego. Działanie maślanu sodu polega na **zmniejszeniu częstotliwości i nasilenia objawów ze strony jelit**. Produkt jest dobrze tolerowany przez organizm.

Działanie

- Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) i inne zaburzenia czynnościowe jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden miesiąc.
- Biegunki i zaburzenia jelitowe wywołane między innymi przez antybiotykoterapię, radioterapię, chemioterapię lub patogeny: zaleca się przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden miesiąc.
- Stosowanie przed i po zabiegu chirurgicznym w obrębie jelit: Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki rano po śniadaniu lub 1 saszetki rano po śniadaniu i 1 saszetki wieczorem po kolacji, przez około 10 -14 dni przed operacją.
- Okres pooperacyjny: Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki rano po śniadaniu lub 1 saszetki rano po śniadaniu i 1 saszetki wieczorem po kolacji, przez około 2 tygodnie po operacji.
- Nieswoiste choroby zapalne jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu.
- Choroba uchyłkowa jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano, po śniadaniu.
- Dieta ograniczająca spożycie błonnika pokarmowego: W celu uzyskania korzystnych efektów postępowania dietetycznego przy ograniczonym spożyciu błonnika należy przyjmować 1 saszetkę Intesta Max rano po śniadaniu przez okres stosowania diety.
- Pobyt w rejonach o niższym standardzie sanitarnym: Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki Intesta Max rano po śniadaniu i 1 saszetki wieczorem po kolacji, przez tydzień przed wyjazdem. Postępowanie należy kontynuować przez cały pobyt.

Sposób użycia

- Granulat w saszetce Intesta max jest nierozpuszczalny w wodzie.
- Zaleca się bezpośrednio wsypać zawartość saszetki Intesta max do ust i popić wodą lub innym płynem o temperaturze pokojowej lub zmieszać z gęstym posiłkiem np. jogurtem lub serkiem.
- Preparat Intesta max ma dodatek naturalnego aromatu żurawinowego, pomimo tego zawartość saszetki może mieć specyficzny zapach, charakterystyczny dla maślanu sodu. Z tego powodu zaleca się połknąć zawartość saszetki bezpośrednio po otwarciu.

Skład

Jedna saszetka preparatu Intesta Max zawiera 2 500 mg mikrogranulowanego maślanu sodu i trójglicerydów pochodzenia roślinnego co odpowiada 750 mg maślanu sodu. Składniki: mieszanina całkowicie uwodornionych trójglicerydów kwasów tłuszczowych z oleju palmowego, maślan sodu, aromat naturalny żurawinowy, substancja słodząca – Acesulfam K .

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Stosować pod nadzorem lekarza.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

- Nie powinien być stosowany przez osoby, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub nie ma wskazań lekarskich do jego stosowania.