

# Kalium hypermanganicum - nadmanganian potasu, proszek, 5 g

Cena: 8,07 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	HASCO-LEK PPF

## Opis produktu

## Działanie

Nadmanganian potasu wykazuje działanie utleniające i antyseptyczne. **Nadmanganian potasu (Kalii permanganas, Kalium hypermanganicum)** to produkt leczniczy w postaci proszku do sporządzania roztworu stosowanego na owrzodzoną skórę, ropiejące rany, do płukania jamy ustnej i gardła.

## Wskazania

Lek **nadmanganian potasu** stosowany jest do przemywania:

- jamy ustnej,
  - ropiejących ran,
  - owrzodzeń,
  - skóry.
- 0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk.
  - 0,025% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

## Skład

Substancją czynną jest: potasu nadmanganian (*Kalii permanganas*).

1 saszетка zawiera 5 g nadmanganianu potasu.

Substancje pomocnicze: brak.

## Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli:** lek do przemywania/płukania,

- **do przemywania skóry** (o stężeniu do 1 %): **szklanka wody i nie więcej niż kilkanaście kryształów** substancji (roztwór powinien być purpurowy),
- **do płukania jamy ustnej i gardła** (o stężeniu 0,02%-0,1%): **szklanka wody i nie więcej niż kilka kryształków** substancji (roztwór powinien być lekko różowy).
- Lek do stosowania zewnętrznego w postaci roztworu.
- Do przemywania lub płukania miejsc zmienionych chorobowo należy używać jedynie świeżo przygotowanych roztworów.
- Roztworu nie należy pić ani połykać.

Kiedy nie stosować leku **Nadmanganian potasu**:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- brązowe zabarwienie skóry.

Długotrwałe i częste stosowanie (szczególnie w wyższym stężeniu) może powodować podrażnienie skóry (zaczerwienienie, wysuszenie).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nadmanganian potasu to silny przeciwutleniacz.
- Przechowywać z dala od substancji łatwopalnych.
- Podczas stosowania należy chronić oczy, nie wdychać roztworu.
- Nie stosować produktu leczniczego do przemywania oczu.
- Nie wolno połykać roztworu w czasie płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

## Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Nadmanganian potasu** może wchodzić w interakcje z innymi lekami / kosmetykami stosowanymi zewnętrznie (silne właściwości utleniające).

## Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować roztworu **nadmanganianu potasu** do płukania jamy ustnej.

Brak przeciwwskazań do stosowania na skórę.