

Ketonal Sprint 25 mg, granulat do sporządzenia roztworu doustnego, 12 saszetek

Cena: 19,05 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,025 g
Producent	SANDOZ GMBH

Opis produktu

Wskazania

Objawowe krótkotrwałe leczenie lekkiego lub umiarkowanego ostrego bólu, takiego jak ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie, ból po lekkich nadwyżężeniach i zwichnięciach.

Skład

1 saszetka zawiera: substancja czynna: 25mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40mg).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: jedna saszetka do trzech razy na dobę. Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę.

Przeciwwskazania

Uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek ze składników leku. Jeśli u pacjenta wystąpiła wcześniej duszność, napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa lub reakcja skórna albo innego rodzaju reakcja alergiczna po zastosowaniu ketoprofenu, lub podobnie działających leków. Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność wątroby, skłonność do krwawień, czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy albo występowało u niego w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego. Jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży. Leku nie można stosować u dzieci poniżej 16 lat. Nie należy stosować bez wyraźnego zalecenia lekarza, jeśli u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko powikłań dotyczących żołądka: jeśli pacjent jest w podeszłym wieku albo przyjmuje niektóre inne leki, takie jak leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwplatekcyjne, kortykosteroidy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Nie należy stosować leku pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Takie leki, jak ketoprofen mogą utrudniać zajście w ciążę. Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy, senność, drgawki lub zaburzenia widzenia, nie należy wykonywać tych czynności.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.