

# Maxigra Go 25 mg (Sildenafil), na zaburzenia erekcji, 8 tabletek powlekanych



Cena: 32,76 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,025 g
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

## Opis produktu

Maxigra Go to lek w postaci okrągłych, obustronnych wypukłych tabletek powlekanych koloru niebieskiego lub jasnoniebieskiego o średnicy 6,0-6,4 mm. Substancją czynną Maxigra Go jest sildenafil, należący do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 o działaniu wspomagającym rozkurcz naczyń krwionośnych, zwiększając napływ krwi do prącia. Substancja czynna zawarta w Maxigra Go pomaga osiągnąć wzwód pod wpływem pobudzenia seksualnego. Lek ten przeznaczony jest do stosowania w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn.

## Wskazania

Zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn.

## Skład

### 1 tabletka powlekana:

- substancję czynną: sylденаfil 25 mg,
- pozostałe składniki: mannitol, krospowidon typ A, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol (MW350), talk, indygotyna, lak (E132).

## Działanie

Wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększającego napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

## Dawkowanie

- **Dorośli:** 1 tabletka na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
- Tabletkę należy połączyć i popijając wodą.

## Przeciwwskazania

- Uczulenie na sylденаfil lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Przyjmowanie:
  - leków zawierających azotany, w tym nitrogliceryny, monoazotanu izosorbidu, diazotanu izosorbidu, tetraazotanu pentaerytrolu,
  - leków lub innych środków uwalniających tlenek azotu, w tym azotyn amylu, tzw. „poppers”,
  - riocyguatu.
- Ciężka choroba serca lub wątroby.
- Wystąpienie u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy udaru lub zawału serca oraz niskie ciśnienie tętnicze.
- Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
- Stwierdzona kiedykolwiek u pacjenta utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.
- Nie stosować:
  - u kobiet.
  - u osób w wieku poniżej 18 lat.

## Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

## Działania niepożądane

Maxigra Go jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxigra Go i niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej:
  - reakcji alergicznej objawiającej się nagłym, świszczącym oddechem, trudnościami w oddychaniu lub zawrotami głowy, obrzękiem powiek, twarzy, ust lub gardła,
  - bólów w klatce piersiowej,
  - nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodów; w przypadku gdy wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem,
  - nagłego pogorszenia lub utraty wzroku,
  - ciężkich reakcji skórnych objawiających się ciężkim łuszczeniem i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu oraz gorączką,
  - napadów padaczkowych lub drgawek.
- Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci.
- U większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu i nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil. Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- ból głowy.

### Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- nudności, niestrawność,
- nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
- widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia,
- uczucie zatkanego nosa,
- zawroty głowy.

### Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze,
- bóle mięśni,
- senność,
- osłabione czucie dotyku,
- zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonięcie w uszach,
- suchość w jamie ustnej,
- zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos),
- krew w moczu,
- ból rąk lub nóg,
- krwawienie z nosa,
- uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

### Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

- omdlenia,
- udar, zawał serca, nieregularne bicie serca,
- przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,

- uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
- krwawienie do tylnej części oka,
- podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
- krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
- suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,
- uczucie drażliwości,
- nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

## Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Lek Maxigra Go może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej.
- Nie należy przyjmować leku Maxigra Go jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza.
- Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
- Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej.
- Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki lub środki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
- Jeśli pacjent przyjmuje riociguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
- W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne, np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania, a ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Maxigra Go (w razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomoc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, krzyżowanie nóg).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra Go należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego),
- anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego,
- dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
- choroby wrzodowej;
- zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).
- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Maxigra Go i natychmiast skontaktować się z lekarzem,
- Leku Maxigra Go nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzroku.
- Leku Maxigra Go nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem sydenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np. tadalafil).
- Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

### Dzieci i młodzież

- Leku Maxigra Go nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Maxigra Go z jedzeniem, pić i alkoholem

- Lek Maxigra Go może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Maxigra Go w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.
- Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra Go, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

- Lek Maxigra Go nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

- Lek Maxigra Go może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxigra Go.

Lek Maxigra Go zawiera sód

- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu".