

Mel 7,5mg - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 30 tabletek



Cena: 22,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 mg

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Opis produktu

Wskazania

w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów

Stosowany

w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Skład

1 tabletkę zawiera: 7,5mg meloksykamu. Pozostałe składniki # to: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD 1634, aromat wanilinowy SD1333, sodu cytrynian bezwodny, aspartam # , Pearlitol Flash # kukurydziana, woda oczyszczona# octan poliwinylu, powidon K30, krospowidon # , d-mannitol, woda oczyszczona# krospowidon (typ B), sodu stearylofumarany, acesulfam potasowy (E950)

Działanie

przeciwzapalne i przeciwbólowe

Dawkowanie

1 tabletkę na 24 godziny

Przeciwwskazania

nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na substancję o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne # , kwas acetylosalicylowy; meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub

innych leków z grupy NLPZ; w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią; u dzieci i młodzież poniżej 15 lat; krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązanych przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ; czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka i # dwunastnicy i krwawienia w wywiadzie # epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia# nerek u pacjentów niedializowanych; krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie; ciężkiej niewydolności serca.