

Mucosolvan 30 mg/ 5 ml, syrop, 100 ml



Cena: 21,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,03 g/5ml
Producent	BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Opis produktu

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Skład

5ml syropu zawiera substancję czynną: 30mg chlorowodorku ambroksolu; ponadto lek zawiera: hydroksyetylocelulozę, sorbitol ciekły, niekryształujący, glicerol 85%, kwas benzoesowy, acesulfam potasowy, aromat truskawkowy PHL 132200, aromat waniliowy 201629, wodę oczyszczoną.

Działanie

Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Dawkowanie

- dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: 10ml syropu 2 razy na dobę;
- dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 5ml syropu 2-3 razy na dobę;
- dzieci w wieku od 2. do 6. lat: 2,5ml syropu 3 razy na dobę;
- dzieci w wieku od 1. do 2. lat: 2,5ml syropu 2 razy na dobę.

Jeśli objawy nie ustąpią po 4-5 dniach należy skontaktować się z lekarzem. Syrop można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na składniki leku; dziedziczna nietolerancja któregośkolwiek ze składników leku (w tym nietolerancja laktozy). Ostrożnie stosować jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężka niewydolność wątroby, powinien zasięgnąć lekarza przed zastosowaniem leku. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią i kobiet w ciąży, zwłaszcza w I trymestrze.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję na niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku (5ml syropu zawiera 1,2g sorbitolu).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.