


## NiQuitin 21 mg/ 24 godz., plastry przezroczyste, 7 sztuk



Cena: 84,97 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BOIRON S.A.

### Opis produktu

### Wskazania

Do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

### Skład

1 plaster o powierzchni 22cm<sup>2</sup> do stosowania na skórze zawiera 114mg nikotyny, dostarcza 21mg nikotyny w ciągu 24 godzin.  
Substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalen/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, łapki kaminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, biały atrament.

## Działanie

Przynosi szybką ulgę w razie nagłego napadu głodu nikotynowego.

## Dawkowanie

Plaster należy stosować raz na dobę. Jeśli w ciągu dnia wypalasz więcej niż 10 papierosów, kurację zacznij od plastra o dawce 21mg (stopień 1). Jeśli w ciągu dnia wypalasz 10 lub mniej papierosów, kurację zacznij od plastra o dawce 14mg (stopień 2).

Kuracja NiQuitin trwa 10 lub 8 tygodni w zależności od jakiego stopnia plastrów rozpocząłeś kurację:

- jeśli zacząłeś z plastrami 21 mg (stopień 1) - stosuj je przez 6 tygodni. Następnie zmniejsz dawkę plastra na 14 mg (Stopień 2), które stosuj przez następne 2 tygodnie. Ostatni Stopień 3 to plastry 7 mg - stosuj je również przez 2 tygodnie.

- jeżeli zacząłeś od Stopnia 2 (plastry 14mg) stosuj je przez 6 tygodni. Później przejdź do Stopnia 3 (plastry 7 mg), które będziesz używać przez następne 2 tygodnie.

## Przeciwwskazania

U pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo podaną nikotynę lub którykolwiek ze składników plastra, świeży zawał serca, z niestabilną dławicą sercową, dławicą Prinzmetalą, ciężka arytmia, po niedawno przeżytym udarze niedokrwinnym mózgu.