

# Nurofen Mięśnie i Stawy, 200 mg, plaster leczniczy, 4 sztuki

Cena: 50,43 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	0,2 g
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

## Opis produktu

### Wskazania

Produkt leczniczy Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego, miejscowego bólu spowodowanego ostrym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

### Skład

Każdy plaster leczniczy zawiera 200mg ibuprofenu # oraz substancje pomocnicze: warstwa przylegająca: makrogol 400, makrogol 20000, lewomentol, kopolimer blokowy Styren-Izopren-Styren 22, poliizobutylen # 55k, poliizobutylen # 1100k, ester uwodornionej kalafonii z glicerolem, parafina ciekła. Warstwa powlekająca: etylenu politereftalan, tkany. Warstwa ochronna: etylenu politereftalan silikonowany.

### Działanie

Przeciwzapalne i przeciwbólowe.

### Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej: Jedna dawka równa jest jednemu plasterowi. Maksymalna dawka w okresie 24 godzin to jeden plaster. Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Do stosowania na nieuszkodzoną skórę. Przed nałożeniem plastra zaleca się dokładne umycie i osuszenie miejsca aplikacji. Plaster można nakładać o dowolnej porze w ciągu dnia lub nocy, ale należy go usunąć i nakleić nowy plaster następnego dnia o tej samej porze. Plaster jest elastyczny i łatwo dopasowuje się do ruchomych

powierzchni ciała, dlatego w razie potrzeby można go nakładać na staw lub w jego pobliżu. Nie należy: przecinać plastra, należy go nakładać w całości, stosować na uszkodzoną lub zranioną skórę, pokrywać go innymi plastrami lub nieprzepuszczalnymi opatrunkami w tym bandażami, moczyć plastra.

### Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, jeśli w przeszłości wystąpiła u pacjenta reakcja alergiczna po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych # lub kwasu acetylosalicylowego, u kobiet w ostatnim trymestrze ciąży, na zranioną, zakażoną skórę, jeśli pacjent choruje na egzemę, na błonę śluzową, wargi ani oczy. Nie stosować dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.