

Oftahist 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 5 ml



Cena: 28,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Postać	krop.do oczu, roztw.
Producent	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Opis produktu

Oftahist jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób alergicznych oczu. Jego działanie polega na zmniejszeniu nasilenia reakcji uczuleniowych. Lek jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek objawiającym się świądem, łzawieniem, zaczerwienieniem oraz obrzękiem powiek i spojówek. Objawom tym często towarzyszy wodnisty katar, kichanie lub swędzenie w nosie i uszach. Pojawiają się one nagle i mają ostry, jednak przemijający przebieg i mogą być wywołane przez niektóre substancje alergenne (alergeny), w tym pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt.

Wskazania

Leczenie objawów ocznych u dorosłych pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.

Skład

1ml leku zawiera:

- substancję czynną: olopatadyna w postaci chlorowodoru 1mg,
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Działanie

Zmniejszenie nasilenia reakcji uczuleniowych oka wywołanych alergenami.

Dawkowanie

- **Dorośli:** 1 kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę (rano i wieczorem), bezpośrednio do worka spojówkowego.
- Należy zachować odstęp co najmniej 8 godzin pomiędzy zakropieniem dawek.
- Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

Czas leczenia wynosi do dwóch tygodni. W przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów w ciągu trzech dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy po konsultacji lekarskiej, jednak nie należy stosować leku dłużej niż 4 miesiące.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po pierwszym otwarciu butelki, lek można stosować przez okres czterech tygodni bez ryzyka zakażenia. Datę otwarcia butelki należy zapisać na wolnej powierzchni etykiety i pudełka.

Działania niepożądane

Lek Oftahist jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

- Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku u skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji nadwrażliwości, w tym problemów z oddychaniem, obrzęku gardła lub twarzy.
- U pacjentów ze znacznie uszkodzoną przednią, przezroczystą warstwą oka (rogówką), bardzo rzadko obserwowano mętne plamy na rogówce spowodowane przez odkładanie się wapnia w trakcie leczenia.

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- działania dotyczące oka: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka,
- objawy ogólne: bóle głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

- działania dotyczące oka: zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka,
- objawy ogólne: zapalenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry (kontaktowe), uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- działania dotyczące oka: obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek,
- objawy ogólne: nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.