

## Oktaseptal aerozol na skórę, 250 ml



Cena: 27,62 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	(0,1g+2g)/100g
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY

### Opis produktu

Oktaseptal® to lek w formie aerozolu do podawania na skórę. Preparat zawiera dwie substancje czynne: dichlorowodorek okteinidyny oraz fenoksyetanol i wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

### Oktaseptal®, aerozol na skórę – działanie

Dichlorowodorek okteinidyny należy do związków kationowo-czynnych i wykazuje działanie antyseptyczne na powierzchni rany i skóry. Fenoksyetanol uzupełnia spektrum działania okteinidyny w głębszych warstwach skóry i błon śluzowych. Preparat Oktaseptal® działa niszcząco na bakterie (łącznie z *Chlamyidium* i *Mycoplasma*), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (*Trichomonas*), wirusy (*Herpes simplex*, inaktywuje HBV i HIV).

Wykazano skuteczność preparatu w zakresie niszczenia mikroorganizmów lub inaktywowania wirusów występuje już po 1 minucie po zastosowaniu płynu na powierzchni skóry. Działanie preparatu utrzymuje się w czasie 1 godziny od zastosowania i tym samym zapewnia bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych.

Stosowanie aerozolu na skórę Oktaseptal jest wskazane w odkażaniu i wspomagającym leczeniu małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi. Wspomagającą może być także używany w postępowaniu antyseptycznym w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach, np. szwów pozabiegowych.

Lek Oktaseptal® znajduje także zastosowanie w wielokrotnym, krótkotrwałym leczeniu antyseptycznym w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźki prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego. Może być również stosowany w pediatrii m.in. do pielęgnacji kikutu

pepowinowego, jak również w odkażaniu jamy ustnej, np. przy aftach, podrażnieniach spowodowanych noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej. Lek jest odpowiedni także do ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej.

## Wskazania

Do stosowania na niezbyt rozległe rany i do wielokrotnego krótkotrwałego leczenia antyseptycznego:

- w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek,
- przed procedurami diagnostycznymi,
- przed i po niedużych zabiegach operacyjnych (w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrici, wenerologii, położnictwie, stomatologii).

## Skład

### Co zawiera lek Oktaseptal®?

100 g roztworu zawiera:

- substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,1 g, fenoksyetanolu 2 g,
- substancje pomocnicze: glicerol 85%, sodu D-glukonian, betaina, kokamidopropylowa 30%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

## Działanie

Antyseptyczne (bakterio-, grzybo- i wirusobójcze).

## Dawkowanie

### Jak stosować aerozol Oktaseptal®?

- Zewnętrznie, na skórę.
- Preparat należy stosować w postaci nierozcieńczonej.
- Lek należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie jałowym gazikiem lub za pomocą przymocznika zapewniając całkowite nawilżenie.

Dezynfekcja skóry i błon śluzowych

- Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi, muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym preparatem lub zwilżone poprzez rozpylenie leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych.
- Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania (minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut).

- Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry między palcami stóp, lek rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

#### Antyseptyka powierzchniowych ran

- Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem.
- Leku należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku.
- W ranach z wysiękiem należy użyć preparatu w postaci przymoczka, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 minutę (wskazane przedłużenie czasu do 5 minut).

#### Pielęgnacja szwów pooperacyjnych

- Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem.
- Leku należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku.
- Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowego gazika nasączonego nierozcieńczonym preparatem i przemywać promieniście od środka na zewnątrz rany.

#### Antyseptyka błony śluzowej pochwy/żołądźci prącia

- Należy zwilżyć preparatem powierzchnie błony śluzowej pochwy/żołądźci prącia, zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę.

#### Dezynfekcja jamy ustnej

- Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml preparatu przez 20 sekund.

#### Pielęgnacja kikuta pępowninowego

- Do pielęgnacji kikuta pępowninowego należy używać gazika nasączonego lekiem.
- Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę wokół.
- Należy utrzymywać kikut pępowninowy dziecka w czystości i suchości.

## Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, fenoksyetanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie należy stosować leku Oktaseptal®:
  - do oka,
  - do płukania jamy brzusznej,
  - u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

