

Phytopharm, Succus Echinaceae 2,425 g/ 2,5 ml, płyn doustny, 50 ml



Cena: 11,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu

Succus Echinaceae Phytopharm to lek w postaci płynu doustnego zawierającego sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej (*Echinacea purpurea*), stabilizowany etanolem. Tradycyjnie preparat stosowany jest wspomagająco w przeziębieniach. Może być także krótkotrwale podawany profilaktycznie w celu zmniejszenia podatności na przeziębienia w okresach wzmożonych zachorowań.

Sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej - właściwości

Przyjmuje się, że lek Succus Echinaceae Phytopharm stymuluje niespecyficznie odpowiedź układu immunologicznego organizmu, podnosząc tym samym odporność na infekcje bakteryjne i wirusowe. W badaniach laboratoryjnych sok z jeżówki purpurowej pobudza aktywność komórek układu odpornościowego, które rozpoznają i niszczą czynniki chorobotwórcze.

Succus Echinaceae Phytopharm jest produktem leczniczym roślinny stosowany tradycyjnie. Jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania

- Wspomagająco w przeziębieniach.
- Do krótkotrwałego zastosowania profilaktycznego w celu zmniejszenia podatności na infekcje w okresach wzmożonych zachorowań.

Skład

Co zawiera lek Succus Echinaceae Phytopharm?

100 ml płynu zawiera:

- substancję czynną: sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej, stabilizowany etanolem (*Echinaceae purpureae herbae recentis succus (1:1)*),
- rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 20-30% (V/V). Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

Działanie

Lek Succus Echinaceae Phytopharm stymuluje niespecyficznie odpowiedź układu immunologicznego organizmu i podnosi odporność na infekcje bakteryjne i wirusowe.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

- **Dorośli:** 2,5 ml płynu 3-4 razy dziennie. 3 - 4 razy dziennie po 2,5 ml,
- **Młodzież od 12 lat:** 1 ml 3 razy dziennie.
- Preparat należy przyjmować codziennie przez 10 dni. Powtórzenie kuracji powinno zostać skonsultowane z lekarzem.
- Leczenie najlepiej rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia.

Przeciwwskazania

- Uczulenia na rośliny z rodziny złożonych (*Asteraceae/Compositae*).
- Postępujące choroby układowe, np. gruźlica, sarkoidoza, kolagenozy, stwardnienie rozsiane), zakażenie wirusem HIV oraz inne schorzenia o charakterze autoimmunologicznym i z autoagresji.
- Choroby alergiczne, np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma.
- Nie stosować:
 - w onkologii w przypadku terapii cytostatykami,
 - u osób po transplantacji szpiku lub innych organów,
 - w zaburzeniach układu hematologicznego, dotyczących białych krwinek, np. agranulocytoza, leukemia).
 - u dzieci poniżej 12 roku życia.

