

## Pirolam 1% żel, 20 g

Cena: 21,65 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Producent	MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A.

### Opis produktu

#### Wskazania

w: leczeniu grzybic skóry gładkiej, leczeniu grzybic skóry owłosionej, leczeniu grzybic stóp, leczeniu grzybic podudzi.

#### Skład

1 żel zawiera: substancje czynne: 10mg cyklopiroksu z olaminą oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, glicerol, karbomer, trolamina, woda oczyszczona. Działanie: przeciwgrzybicze, przeciwzapalne.

#### Dawkowanie

u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat: lek stosuje się miejscowo na skórę. Zwykle lek Pirolam stosuje się 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia. Leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych. Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie. Aby zapobiec nawrotowi choroby, zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych. Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować opatrunków i plastrów.

#### Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli pacjent ma grzybicze zakażenie oka, okolic oczu lub pochwy, u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje, że nie jest to bezwzględnie konieczne.