

## Ranigast SOS na zgagę, 24 tabletek do ssania



Cena: 17,08 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

### Opis produktu

Ranigast S-O-S jest wyrobem medycznym, który zmniejsza dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przetykowym takie jak zgaga i ból w nadbrzuszu. Dodatkowo łagodzi nadkwaśność i chroni śluzówkę żołądka. Sole zobojętniające zawarte w produkcie (węglan i wodorowęglan) umożliwiają wyrównanie kwasoty soku żołądkowego, chroniąc przed wystąpieniem uczucia pieczenia, bólu w nadbrzuszu i niestrawności. Natomiast alginiany, występujące w postaci włókien, w reakcji z kwaśnym środowiskiem żołądka, ulegają żelifikacji, tworząc warstwę ochronną śluzówki żołądka, co obniża częstotliwość refluksu. Produkt zawiera połączenie kilku substancji działających synergistycznie w środowisku żołądka, niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu. Ranigast S-O-S może być stosowany wspomagająco przy leczeniu zapalenia żołądka. Zawarte w produkcie substancje zobojętniające charakteryzują się szybkim działaniem neutralizującym kwasotę soku żołądkowego.

### Zastosowanie

łagodzenie objawów refluksu żołądkowo-przetykowego takich jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu.

### Sposób użycia

dorośli w młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki po głównym posiłku, w razie potrzeby popić wodą. Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletką po głównym posiłku, w razie potrzeby popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

### Składniki

alginian sodu 200mg, kwas alginowy 50mg, wodorowęglan sodu 80mg, węglan wapnia 140mg, substancje pomocnicze: mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru, aromaty: cytrynowy, miętowy.

**Przeciwwskazania**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego.

Przeciwwskazaniem do stosowania produktu są przewlekłe zaparcia lub biegunki, choroby nerek i przewlekła niewydolność serca.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Zastosowanie większej ilości produktu może prowadzić do wystąpienia zaparcia lub przemijającej biegunki.

**Ważne wskazówki**

Przed zastosowaniem produktu w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Preparatu nie należy stosować nieprzerwanie dłużej niż 30 dni. W przypadku potrzeby dłuższego stosowania zaleca się konsultację z lekarzem.

Produkt należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.

**Ostrzeżenia**

Ranigast S-O-S zasadniczo jest przeznaczony do stosowania u osób powyżej 18. roku życia. Okazjonalnie może być stosowany u młodzieży i dzieci od lat 6, przy czym u dzieci w wieku 6-12 lat dawkę należy zmniejszyć o połowę i stosować produkt zgodnie z zaleceniami.

Wyrób medyczny może opóźniać lub ograniczać wchłanianie innych jednocześnie podawanych substancji i leków. Zaleca się zachowanie co najmniej 2 godzin odstępu pomiędzy przyjęciem wyrobu medycznego Ranigst S-O-S, a zastosowaniem suplementów diety, preparatów ziołowych i homeopatycznych.

Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone