

## Recigar 1,5 mg, 100 tabletek powlekanych



Cena: 71,98 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg
Producent	ADAMED PHARMA S.A.

### Opis produktu

### Wskazania

W leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Recigar jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

### Skład

Substancją czynną leku jest cytyzyna. Każda tabletkę zawiera 1,5 mg cytyzyny. Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: Hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Skład otoczki: AquaPolish P green Project 16712 [hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek (E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam (E951)].

## Działanie

Zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić.

## Dawkowanie

Przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem. Od 1. do 3. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 2 godziny (6 tabletek na dobę), od 4. do 12. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 2,5 godziny (5 tabletek na dobę), od 13. do 16. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 3 godziny (4 tabletki na dobę), od 17. do 20. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 5 godzin (3 tabletki na dobę), od 21. do 25. dnia należy przyjmować 1-2 tabletki na dobę (do 2 tabletek). Należy zrezygnować z palenia nie później niż 5-tego dnia po rozpoczęciu terapii. Nie należy palić podczas trwania terapii, ponieważ może to nasilić działania niepożądane. Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęcia leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy można je rozpocząć ponownie. Recigar należy przyjmować doustnie popijając odpowiednią ilością wody. Jedno opakowanie produktu leczniczego Recigar (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

## Przeciwwskazania

Recigar jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej wersji Charakterystyki Produktu Leczniczego, jak również w przypadku: niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego niedawno zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania produktu u osób w wieku poniżej 18 lat, u osób podeszłym wieku (powyżej 65 lat). Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Recigar, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.