

Rivel 0,5 % (5 mg/g), żel, 30 g

Cena: 27,53 PLN



Opis słownikowy

Dawka	5 mg/g
Producent	EMO-FARM SP.Z O.O.

Opis produktu

Lek Rivel 0,5 % jest żelem do stosowania miejscowego. W skład leku wchodzi substancja czynna – mleczan etakrydyny. Lek po zastosowaniu na skórę wykazuje silne **działanie przeciwbakteryjne**, jednocześnie **łagodzi dolegliwości bólowe i stan zapalny**.

Wskazania

Lek Rivel stosuje się miejscowo:

- w odkażaniu skóry i błon śluzowych;
- we wspomagającym leczeniu zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie (czyraki, czyraki mnogie, ropnie), mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych);
- po ukąszeniu owadów.

Skład

Substancja czynna
Pozostałe składniki

mleczan etakrydyny 5 mg/g
etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy,
woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę lub błony śluzowe.

Należy nakładać cienką warstwę leku na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe 2-3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej). Lek może być stosowany pod opatrunek.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i nasilenia zmian chorobowych. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie na mleczan etakrydyny, inne pochodne akrydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.