

## Sachol Fast Effect Spray, 20ml

Cena: 26,06 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O.

### Opis produktu

Sachol Fast Effect, aerozol, butelka to wyrób medyczny w formie sprayu w butelce z dozownikiem.

### Działanie i właściwości

Sachol Fast Effect, aerozol, butelka wykazuje skuteczne działanie barierowe, pozwalając na zmniejszenie bólu towarzyszącego aftom i ułatwia gojenie owrzodzenia. Ma miętowy aromat. Nie zawiera alkoholu (nie powoduje pieczenia), parabenów oraz cukru.

- Spray na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej
- łagodzi dyskomfort i ból
- ułatwia gojenie aft
- nie zawiera alkoholu (nie wywołuje pieczenia)
- nie zawiera parabenów
- bez cukru
- dzięki specjalnemu składowi spray wykazuje skuteczne działanie barierowe, umożliwiając zmniejszenie bólu w miejscach afty i ułatwia gojenie owrzodzenia
- zawiera aromat miętowy

### Zastosowanie / wskazania

Sachol Fast Effect, aerozol, butelka przeznaczony jest do stosowania w jamie ustnej, łagodzi dyskomfort i ból związany z aftami i aftowym zapaleniem jamy ustnej, a także ułatwia gojenie aft.

### Składniki

Woda, ksylitol, gliceryna, wyciąg z płatków róży damasceńskiej, polisorbat 20, aromat miętowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu, stewia, guma ksantanowa, polikarbofil, kwas mlekowy, pantenol, sól sodowa kwasu hialuronowego, wyciąg z liści aloesu zwyczajnego.

## Stosowanie Sachol Fast Effect, aerozol, butelka

Umieścić dozownik nad obszarem zmienionym chorobowo i nałożyć wyrób. Stosować dwa razy dziennie (lub w razie potrzeby częściej), pomiędzy posiłkami, przez tydzień lub do momentu ustąpienia objawów. Zaleca się powstrzymanie od jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po nałożeniu, aby ułatwić przyleganie wyrobu do błony śluzowej.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania tego wyrobu u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia.

Wyrób jest przeznaczony do stosowania w jamie ustnej.

Nie stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości na jeden lub więcej składników wyrobu.

Jeśli pacjent aktualnie stosuje, niedawno stosował lub planuje stosować inne leki, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaleca się stosowanie wyrobu przynajmniej 2 godziny po zażyciu leków lub suplementów.

Jeśli objawy nie ulegną złagodzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zamknąć opakowanie po każdym użyciu.

Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem.

Termin ważności zamieszczony na opakowaniu dotyczy nienaruszonego opakowania wyrobu, który jest prawidłowo przechowywany.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Nie używać wyrobu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.

Nie należy przyjmować wyrobu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Wyrób należy używać zgodnie z instrukcjami.

Wyrób należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Unikać kontaktu z oczami.

## Sachol Fast Effect, aerozol, butelka a ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem zaleca się konsultację z lekarzem.

## Przechowywanie

Preparat należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. poniżej 25 °C. w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Należy zużyć w ciągu 14 dni od pierwszego otwarcia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.