

Saridon, 20 tabletek

Cena: 32,89 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,25g+0,15g+0,05g
Producent	ROCHE CONSUMER HEALTH LTD.

Opis produktu

Wskazania

ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny, ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą.

Skład

1 tabletkę zawiera: substancje czynne: paracetamol 250mg, propyfenazon 150mg, kofeinę 50mg oraz substancje pomocnicze: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, esma-spreng, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie

Saridon zawiera paracetamol i propyfenazon, działające przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, oraz małą dawkę kofeiny, która nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Dawkowanie

zazwyczaj stosowana dawka leku Saridon u dorosłych to:1-2 tabletki, młodzież w wieku 12-16 lat: 1 tabletkę. Tabletki należy popić dużą ilością wody lub innego płynu. Leku nie należy przyjmować dłużej niż jeden tydzień ani w dawkach większych niż zalecane.

Przeciwwskazania

uczulenie na którykolwiek ze składników leku, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, choroba alkoholowa, ciężka

niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek, porfiria wątrobową, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, astma, ciąża, laktacja.