

Scopolan Compositum 10mg+250mg, 10 tabletek drażowanych

Cena: 15,97 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,01g+0,25g
Producent	HERBAPOL-WROCŁAW S.A.

Opis produktu

Wskazania

dolegliwości bólowe w stanach skurczowych: przewodu pokarmowego # , dróg żółciowych # wątrobowa) i układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza).

Skład

substancje czynne: butylobromek hioscyny # 10mg, metamizol sodowy jednowodny # monohydricum# magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171).

Działanie

rozkurczowe, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo. Lek należy stosować doraźnie. Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę. Leku nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

uczulenie na którykolwiek ze składników leku, nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,uczulenie na alkaloidy tropanowe i ich pochodne, zmiany w obrazie morfologicznym krwi; leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa, ostra niewydolność nerek lub wątroby, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost prostaty, niedrożność porażenna jelit, zaparcia atoniczne, zwężenie przetyku, wypustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni # , patologiczne poszerzenie jelita grubego, ciąża, laktacja. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Podczas przyjmowania leku nie należy spożywać alkoholu oraz prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.